

Mesures anthropométriques – Adultes 18-74 ans

Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

Tableau 1.5.6. : Rapport taille/hanche des adultes de 18 à 74 ans : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5^e et 97,5^e percentiles, minimum et maximum (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)

	Age (années)			Tous
	18-29 ans	30-54 ans	55-74 ans	
Hommes				
≤ 0,70	-	0,5	-	0,2
≤ 0,75	0,0	1,0	-	0,5
≤ 0,80	16,1	3,3	0,7	5,4
≤ 0,85	43,3	14,2	4,1	17,9
≤ 0,90	69,7	38,7	11,0	38,0
≤ 0,95	86,0	69,8	33,7	63,5
≤ 1,00	95,1	89,6	70,0	85,4
Moyenne	0,9	90,5	1,0	0,9
Médiane	0,9	91,4	1,0	0,9
2,5 ^e percentile	0,9	0,8	0,8	0,8
97,5 ^e percentile	1,5	1,1	1,1	1,1
Minimum	0,8	0,6	0,8	0,6
Maximum	1,5	1,1	1,7	1,7
Femmes				
≤ 0,70	14,1	4,3	1,5	5,5
≤ 0,75	38,8	20,9	6,9	20,4
≤ 0,80	76,0	45,3	26,8	46,1
≤ 0,85	89,0	73,9	58,4	72,4
≤ 0,90	96,2	88,6	80,4	87,8
≤ 0,95	98,1	97,5	91,9	96,0
≤ 1,00	99,2	99,5	98,0	99,0
Moyenne	0,8	0,8	0,8	0,8
Médiane	0,8	0,8	0,8	0,8
2,5 ^e percentile	0,6	0,7	0,7	0,7
97,5 ^e percentile	0,9	1,0	1,0	1,0
Minimum	0,6	0,6	0,6	0,6
Maximum	1,0	1,4	2,0	2,0

Conditions de mesure : rapport entre la circonférence de taille et la circonférence de hanches ; hors femmes enceintes.
Résultats pondérés et redressés.

Note : les seuils de référence retenus sont ceux de l'Organisation mondiale de la santé (1) : le rapport taille/hanche est considéré comme à risque s'il est >1 pour les hommes et >0,85 pour les femmes.

(1) World Health Organization (WHO). Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Health Organ Tech Rep Ser 2000;1-253.