

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d'alerte dans les domaines de la santé publique, analyse les données de la grippe issues de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de l'analyse de ces données dans ce bulletin mis en ligne chaque semaine sur son site internet.

Points clés


- ▶ Métropole : niveau de base pour tous les indicateurs
- ▶ La Réunion : activité grippale en diminution mais toujours au-dessus des valeurs habituellement observées
- ▶ Mayotte : confirmation de la diminution de l'activité grippale

Chiffres clés en métropole

En semaine 47


- ▶ 42 consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants en médecine ambulatoire (Sentinelles) (Intervalle de confiance à 95% : [33 - 51])
- ▶ 1,6% des consultations de SOS Médecins pour syndrome grippal
- ▶ <1% de passages aux urgences pour syndrome grippal parmi tous les passages
- ▶ 5 prélèvements positifs pour la grippe en médecine ambulatoire (Sentinelles)
- ▶ 36 prélèvements positifs en milieu hospitalier (Réseau national des laboratoires hospitaliers, Renal)
- ▶ 2 cas graves admis en réanimation
- ▶ 8 signalements de foyers d'infections respiratoires aiguës en collectivités de personnes âgées

Figure 1: Taux de consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants en métropole : saisons 2015-2016, 2016-17 et 2017-18



Source : Données Sentinelles

Figure 2 : Niveau d'alerte régional en semaine 47/2017





Source : analyse épidémiologique des Cire - Auteurs : SpFrance - 2017

Depuis le début de la surveillance (semaine 40)

- ▶ En médecine ambulatoire (Sentinelles)
 - 17 prélèvements positifs pour grippe (13 virus de type A et 4 de type B) sur les 183 prélèvements analysés
- ▶ En médecine hospitalière (Renal)
 - 145 prélèvements positifs pour grippe (78% de virus de type A) parmi les 12 199 prélèvements analysés
- ▶ 8 cas graves admis en réanimation (*début de la surveillance semaine 45*)
- ▶ 126 signalements de foyers d'infections respiratoires aiguës en collectivités de personnes âgées

Santé publique France s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance de la grippe :
médecins libéraux, urgentistes, laboratoires, réanimateurs et épidémiologistes



Départements d'outre-mer

Aux [Antilles](#) et en [Guyane](#), les indicateurs sont à leur niveau de base.

A [La Réunion](#), l'épidémie de grippe saisonnière, de forte intensité cette année, a atteint son pic début octobre. Depuis, l'activité grippale diminue mais se situe toujours au-dessus des valeurs moyennes de la période 2010-2016. Depuis le début de l'année, 60 personnes ont été hospitalisées en réanimation pour une forme sévère de grippe, dont 14 sont décédées.

Bien que le virus B reste majoritaire sur l'ensemble de la période épidémique, sa part diminue depuis la semaine 40 et représente 36% des virus identifiés entre S40 et S46; des virus A (H1N1)_{pdm09} (41%) et A non-H1N1 (23%) sont également identifiés.

A [Mayotte](#), l'épidémie débutée fin septembre semble avoir atteint son pic en semaine 45. La diminution de la part des consultations pour syndrome grippal chez les médecins sentinelles se confirme en semaine 47 avec 11% comparée à 16% en semaine 46. Cependant ces proportions restent à des niveaux élevés par rapport à ceux observés à la même période depuis 2010. Cinq personnes ont été hospitalisées en réanimation, dont une est décédée. Parmi les virus grippaux détectés en 2017, le virus A(H1N1)_{pdm09} est majoritaire.

Europe

En semaine 46, l'activité grippale est à son niveau de base dans tous les pays européens participant à la surveillance.

Source : <http://www.flunewseurope.org>.

► La prévention pour diminuer le risque de grippe

- **La vaccination** est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications. Un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé. Pour plus d'information, consultez le site [Vaccination info service](#).
- **Les mesures barrières**
 - Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
 - Porter un masque quand on présente un syndrome grippal
 - Limiter les contacts avec les personnes malades
 - Aérer son logement chaque jour pour en renouveler l'air

Pour en savoir plus sur la prévention, consultez le site de [Santé publique France](#).

Pour vous [abonner](#) au Bulletin hebdomadaire grippe.

Pour en savoir plus sur la grippe saisonnière, suivez ces liens:

- En France : [la surveillance de la grippe](#) ; [les données de surveillance](#)
- En région : consultez les [Points Epidémiologiques des Cire](#)
- A l'international : [OMS](#) et [ECDC](#)

Remerciements aux réseaux de médecine ambulatoire notamment le réseau Sentinelles, les médecins de SOS Médecins, aux services d'urgences du réseau Oscour®, aux réanimateurs et à leurs sociétés savantes (SRLF, GFRUP, SFAR), aux ARS, aux laboratoires, au CNR des virus influenzae, aux cliniciens, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance de la grippe.

Directeur de publication
François Bourdillon

Rédactrice en chef
Sibylle Bernard-Stoecklin

Comité de rédaction
Christine Campèse
Daniel Lévy-Bruhl
Yann Savitch

Contact presse
Vanessa Lemoine
Tél : 33 (0)1 55 12 53 36
presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion
Santé publique France
12 rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice cedex
Tél : 33 (0)1 41 79 67 00
invs.santepubliquefrance.fr