

Les découvertes de séropositivité VIH chez les jeunes et les seniors

Unité VIH-Hépatites B et C-IST, Direction des maladies infectieuses,

Données actualisées au 31/01/2018

Les données de la déclaration obligatoire du VIH permettent de disposer de données chez les personnes qui découvrent chaque année leur séropositivité (période 2003-2016). Même si ces données ne permettent pas de connaître la dynamique de l'épidémie en temps réel, en raison d'un délai entre contamination et diagnostic, elles sont néanmoins un très bon indicateur indirect.

En 2016, le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité VIH est estimé à environ 6 000.

Les jeunes de 15 à 24 ans

Les jeunes représentent 11% de ces découvertes soit un peu moins de 700 découvertes en 2016. On observe une stabilité depuis plusieurs années de cette proportion, ainsi que du nombre de découvertes dans cette classe d'âge (cf. figure).

Parmi ces jeunes, plus des deux tiers sont des hommes, majoritairement contaminés par rapports entre hommes (pour 80% d'entre eux). Depuis 2012, le nombre de découvertes dans ce groupe est stable et n'augmente plus (environ 400/an). Un quart de ces jeunes HSH sont nés à l'étranger.

La quasi-totalité (93%) des femmes ont été contaminées lors de rapports hétérosexuels et 77% d'entre elles sont nées à l'étranger.

La proportion de jeunes contaminés par usage de drogues est très faible (0,6% en 2016).

Globalement, 47% des jeunes de 15-24 ans ayant découvert leur séropositivité en 2016 sont nés à l'étranger, dont les deux tiers en Afrique subsaharienne.

En 2016, 14% des diagnostics chez les jeunes étaient réalisés à un stade avancé de l'infection (moins de 200 CD4/mm³ ou stade sida).

Les seniors de 50 ans et plus

Après avoir augmenté entre 2003 et 2014 (de 13% à 21%), la part des 50 ans et plus parmi les découvertes s'est stabilisée (20% en 2016), ce qui représente environ 1 200 découvertes annuelles dans cette classe d'âge (cf. figure).

Près des trois-quarts sont des hommes (72% en 2016), qui ont été contaminés pour moitié par rapports entre hommes (11% des HSH seniors sont nés à l'étranger) et pour moitié lors de rapports avec des femmes (53% des hétérosexuels seniors sont nés à l'étranger).


Les femmes sont toutes contaminées lors de rapports hétérosexuels, 60% d'entre elles sont nées à l'étranger.

La proportion de seniors contaminés par usage de drogues reste faible (entre 1 et 2% selon les années).

Globalement, 41% des seniors ayant découvert leur séropositivité en 2016 sont nés à l'étranger, dont les deux tiers en Afrique subsaharienne.

En 2016, 38% des seniors découvrent leur séropositivité à un stade avancé de l'infection (moins de 200 CD4/mm³ ou stade sida), ce qui est faveur d'un délai trop long entre infection et diagnostic (pas de conscience du risque ?). Mais plus d'un quart des diagnostics (28%) correspondent à des infections récentes, ce qui indique également des prises de risques dans ce groupe d'âge.

Nombre de découvertes de séropositivité VIH par classe d'âge, France, 2003-2016



Références

Lot F, Smati J, Montlahuc C, Cazein F, Barin F, Le Strat Y, Pillonel J, Dollfus C. Découvertes de séropositivité VIH chez les jeunes – France 2003-2013. BEH 2015; 40-41 : 744-51.

Cazein F, Pinget R, Pillonel J, Lot F, Barin F, Le Strat Y, Bousquet V, Thierry D, Semaille C. HIV diagnoses among people aged 50 and over, France, 2003-2008: a high proportion of late diagnoses. International AIDS conference, Vienne, 2010. Abstract TUPE0432.

Santé publique France. Point épidémiologique - Infection par le VIH et IST bactériennes. 28/11/2017. <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/VIH-sida-IST/Infection-a-VIH-et-sida/Actualites/Infection-par-le-VIH-et-les-IST-bacteriennes.-Point-epidemiologique-du-28-novembre-2017>