


Décès par contact avec des frelons, guêpes et abeilles France métropolitaine de 2000 à 2010, source CépiDc

Les données de mortalité en France sont issues de la base nationale des causes médicales de décès, élaborée à partir des certificats de décès par le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc-Inserm). Les causes de décès sont codées par le CépiDc, selon la Classification internationale des maladies, 10ème révision (CIM-10) depuis l'année 2000.

Les décès ont été analysés selon la cause initiale de décès, à partir du code de la CIM-10 « X23 » : *Contacts avec des frelons, guêpes et abeilles (y compris les hyménoptères du genre vespula)* de 2000 à 2010 en France métropolitaine.


Sur la période 2000 à 2010, 153 personnes sont décédées par contacts avec un hyménoptère, soit en moyenne 14 décès par an. En 2004 et 2005, les décès ont été plus nombreux que les autres années : respectivement 23 et 20 décès.

Nombre de décès (en cause principale) par contact avec des frelons, guêpes et abeilles, France métropolitaine 2000-2010, N=153



Le sex-ratio est en défaveur des hommes : 2,9 décès d'hommes pour 1 femme, soit 114 hommes pour 39 femmes sur la période 2000-2010. Les décès par contact avec un hyménoptère ont concerné en majorité des personnes de 45-64 ans, 40 % sur l'ensemble de la période, alors qu'ils représentent 26 % de la population totale. Chez les 65-74 ans cette proportion était de 25 %, alors qu'ils représentent 8 % de la population totale.

**Nombre de décès (en cause principale) par contact avec des frelons, guêpes et abeilles
par classe d'âges, France métropolitaine 2000-2010, N=153**



Il y a une saisonnalité très marquée de ces décès, avec 4 décès sur 5 (81 %) survenus entre les mois de juin et septembre, et un pic en août (32 %).

**Nombre de décès (en cause principale) par contact avec des frelons, guêpes et abeilles
par mois, France métropolitaine 2000-2010, N=153**

