

Taux d'incidence départementaux, bruts et standardisés\*, des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien chez les 20-64 ans, selon le sexe,  
France métropolitaine, 2014

Région	département de résidence	Effectif Hommes	Incidence brute % Hommes	Inc Stand % Hommes [IC95%]	Effectif Femmes	Incidence brute % Femmes	Inc Stand % Femmes [IC95%]	Effectif Ensemble	Incidence brute % Ensemble	Inc Stand % Ensemble [IC95%]
<i>Ile-de-France</i>		2 769	0,8	0,9 [0,8-0,9]	7 689	2,1	2,2 [2,2-2,3]	10 458	1,4	1,6 [1,5-1,6]
	Hauts-de-Seine	169	0,4	0,4 [0,3-0,5]	623	1,2	1,4 [1,3-1,5]	792	0,8	0,9 [0,8-1,0]
	Seine-Saint-Denis	292	0,6	0,7 [0,6-0,8]	883	1,9	2,1 [1,9-2,2]	1 175	1,3	1,4 [1,3-1,5]
	Yvelines	462	1,1	1,2 [1,1-1,3]	1 187	2,8	2,8 [2,7-3,0]	1 649	2,0	2,0 [1,9-2,1]
	Paris	287	0,4	0,5 [0,4-0,6]	850	1,1	1,4 [1,3-1,5]	1 137	0,8	0,9 [0,9-1,0]
	Val-de-Marne	329	0,8	0,9 [0,8-1,0]	965	2,3	2,4 [2,3-2,6]	1 294	1,6	1,7 [1,6-1,8]
	Essonne	415	1,1	1,2 [1,1-1,3]	933	2,5	2,6 [2,4-2,7]	1 348	1,8	1,9 [1,8-2,0]
	Seine-et-Marne	484	1,2	1,2 [1,1-1,3]	1 264	3,0	3,1 [2,9-3,3]	1 748	2,1	2,2 [2,1-2,3]
	Val-d'Oise	331	1,0	1,0 [0,9-1,1]	984	2,7	2,8 [2,6-3,0]	1 315	1,8	1,9 [1,8-2,0]
<i>Centre-Val-de-Loire</i>		1 353	1,9	1,8 [1,7-1,9]	2 911	4,0	3,9 [3,8-4,0]	4 264	3,0	2,9 [2,8-3,0]
	Loiret	343	1,9	1,8 [1,6-2,0]	742	3,9	3,9 [3,6-4,1]	1 085	2,9	2,9 [2,7-3,0]
	Indre-et-Loire	254	1,5	1,5 [1,3-1,7]	620	3,6	3,6 [3,3-3,9]	874	2,6	2,6 [2,4-2,7]
	Eure-et-Loir	225	1,9	1,8 [1,6-2,0]	510	4,1	4,0 [3,7-4,4]	735	3,0	2,9 [2,7-3,1]
	Indre	148	2,4	2,2 [1,9-2,6]	292	4,8	4,4 [3,9-4,9]	440	3,6	3,3 [3,0-3,6]
	Cher	164	1,9	1,8 [1,5-2,1]	313	3,6	3,4 [3,0-3,8]	477	2,8	2,6 [2,4-2,8]
	Loir-et-Cher	219	2,4	2,3 [2,0-2,6]	434	4,8	4,5 [4,1-4,9]	653	3,6	3,4 [3,1-3,7]
<i>Bourgogne-Franche-Comté</i>		1 490	1,9	1,8 [1,7-1,9]	2 942	3,7	3,6 [3,5-3,8]	4 432	2,8	2,7 [2,7-2,8]

Taux d'incidence départementaux, bruts et standardisés\*, des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien chez les 20-64 ans, selon le sexe, France métropolitaine, 2014

Région	département de résidence	Effectif Hommes	Incidence brute % Hommes	Inc Stand % Hommes [IC95%]	Effectif Femmes	Incidence brute % Femmes	Inc Stand % Femmes [IC95%]	Effectif Ensemble	Incidence brute % Ensemble	Inc Stand % Ensemble [IC95%]
	Côte-d'Or	215	1,4	1,4 [1,2-1,6]	393	2,5	2,6 [2,3-2,8]	608	2,0	2,0 [1,9-2,2]
	Territoire de Belfort	63	1,5	1,5 [1,2-1,9]	126	3,1	3,1 [2,5-3,6]	189	2,3	2,3 [2,0-2,6]
	Yonne	267	2,9	2,7 [2,4-3,1]	491	5,2	5,0 [4,5-5,4]	758	4,1	3,9 [3,6-4,1]
	Nièvre	136	2,4	2,2 [1,8-2,5]	277	4,8	4,5 [3,9-5,0]	413	3,6	3,3 [3,0-3,7]
	Doubs	187	1,2	1,3 [1,1-1,4]	455	3,0	3,0 [2,8-3,3]	642	2,1	2,2 [2,0-2,3]
	Haute-Saône	111	1,7	1,6 [1,3-1,9]	263	4,0	3,8 [3,3-4,2]	374	2,8	2,7 [2,4-2,9]
	Saône-et-Loire	361	2,4	2,2 [2,0-2,5]	618	4,1	3,8 [3,5-4,1]	979	3,2	3,0 [2,8-3,2]
	Jura	150	2,1	2,0 [1,7-2,3]	319	4,5	4,2 [3,8-4,7]	469	3,3	3,1 [2,8-3,4]
<i>Normandie</i>		1 679	1,8	1,8 [1,7-1,9]	3 761	4,0	3,9 [3,8-4,0]	5 440	2,9	2,8 [2,8-2,9]
	Seine-Maritime	583	1,7	1,7 [1,5-1,8]	1 378	3,8	3,8 [3,6-4,0]	1 961	2,7	2,7 [2,6-2,9]
	Calvados	365	1,9	1,9 [1,7-2,1]	858	4,3	4,3 [4,0-4,6]	1 223	3,1	3,1 [2,9-3,3]
	Orne	149	1,9	1,8 [1,5-2,1]	313	4,0	3,8 [3,4-4,2]	462	3,0	2,8 [2,6-3,1]
	Eure	337	2,0	1,9 [1,7-2,1]	708	4,1	4,0 [3,7-4,3]	1 045	3,1	3,0 [2,8-3,2]
	Manche	245	1,8	1,7 [1,5-1,9]	504	3,7	3,5 [3,2-3,8]	749	2,7	2,6 [2,4-2,8]
<i>Hauts-de-France</i>		2 788	1,6	1,7 [1,6-1,7]	6 140	3,5	3,6 [3,5-3,6]	8 928	2,6	2,6 [2,6-2,7]
	Aisne	353	2,3	2,2 [2,0-2,5]	650	4,2	4,1 [3,8-4,5]	1 003	3,3	3,2 [3,0-3,4]
	Somme	446	2,7	2,8 [2,5-3,0]	824	5,0	5,0 [4,7-5,4]	1 270	3,9	3,9 [3,7-4,1]
	Pas-de-Calais	722	1,7	1,7 [1,6-1,9]	1 655	3,9	3,9 [3,7-4,1]	2 377	2,8	2,8 [2,7-2,9]
	Oise	344	1,5	1,4 [1,3-1,6]	806	3,4	3,3 [3,1-3,6]	1 150	2,4	2,4 [2,3-2,5]
	Nord	923	1,2	1,3 [1,2-1,4]	2 205	2,9	3,0 [2,9-3,1]	3 128	2,1	2,2 [2,1-2,2]
<i>Grand-Est</i>		3 102	1,9	1,9 [1,8-2,0]	6 339	3,9	3,9 [3,8-3,9]	9 441	2,9	2,9 [2,8-2,9]
	Aube	191	2,2	2,2 [1,9-2,5]	374	4,3	4,3 [3,8-4,7]	565	3,3	3,3 [3,0-3,5]

**Taux d'incidence départementaux, bruts et standardisés\*, des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien chez les 20-64 ans, selon le sexe,  
France métropolitaine, 2014**

Région	département de résidence	Effectif Hommes	Incidence brute % Hommes	Inc Stand % Hommes [IC95%]	Effectif Femmes	Incidence brute % Femmes	Inc Stand % Femmes [IC95%]	Effectif Ensemble	Incidence brute % Ensemble	Inc Stand % Ensemble [IC95%]
	Vosges	227	2,2	2,1 [1,8-2,3]	361	3,5	3,3 [3,0-3,6]	588	2,8	2,7 [2,5-2,9]
	Ardennes	160	2,0	1,9 [1,6-2,2]	271	3,4	3,3 [2,9-3,7]	431	2,7	2,6 [2,4-2,8]
	Haut-Rhin	343	1,6	1,5 [1,3-1,7]	841	3,7	3,7 [3,4-3,9]	1 184	2,7	2,6 [2,4-2,7]
	Meuse	132	2,4	2,3 [1,9-2,7]	279	5,3	5,1 [4,5-5,7]	411	3,8	3,7 [3,3-4,0]
	Bas-Rhin	641	1,9	2,0 [1,8-2,1]	1 339	4,0	4,0 [3,8-4,2]	1 980	3,0	3,0 [2,9-3,1]
	Moselle	533	1,7	1,7 [1,5-1,8]	1 102	3,5	3,5 [3,3-3,7]	1 635	2,6	2,6 [2,5-2,7]
	Meurthe-et-Moselle	385	1,8	1,9 [1,7-2,1]	782	3,6	3,7 [3,5-4,0]	1 167	2,7	2,8 [2,7-3,0]
	Haute-Marne	150	2,9	2,9 [2,4-3,3]	239	4,8	4,6 [4,0-5,2]	389	3,9	3,7 [3,4-4,1]
	Marne	340	2,1	2,1 [1,9-2,3]	751	4,5	4,6 [4,2-4,9]	1 091	3,3	3,4 [3,2-3,6]
<i>Pays de la Loire</i>		<i>1 839</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8 [1,7-1,9]</i>	<i>3 407</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3 [3,1-3,4]</i>	<i>5 246</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5 [2,4-2,6]</i>
	Maine-et-Loire	500	2,2	2,3 [2,1-2,4]	837	3,7	3,7 [3,5-4,0]	1 337	3,0	3,0 [2,8-3,2]
	Loire-Atlantique	480	1,3	1,3 [1,2-1,4]	927	2,4	2,4 [2,3-2,6]	1 407	1,8	1,8 [1,8-1,9]
	Sarthe	370	2,4	2,3 [2,1-2,5]	755	4,8	4,7 [4,3-5,0]	1 125	3,6	3,5 [3,3-3,7]
	Vendée	287	1,6	1,5 [1,3-1,7]	525	2,9	2,8 [2,5-3,0]	812	2,2	2,2 [2,0-2,3]
	Mayenne	202	2,4	2,3 [2,0-2,6]	363	4,4	4,3 [3,8-4,7]	565	3,4	3,3 [3,0-3,5]
<i>Bretagne</i>		<i>1 108</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2 [1,1-1,3]</i>	<i>2 012</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2 [2,1-2,2]</i>	<i>3 120</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7 [1,6-1,7]</i>
	Ille-et-Vilaine	336	1,1	1,2 [1,0-1,3]	657	2,2	2,3 [2,1-2,5]	993	1,7	1,7 [1,6-1,8]
	Finistère	316	1,2	1,2 [1,1-1,3]	525	2,1	2,0 [1,8-2,2]	841	1,7	1,6 [1,5-1,7]
	Morbihan	227	1,1	1,1 [0,9-1,2]	439	2,1	2,0 [1,8-2,2]	666	1,6	1,5 [1,4-1,7]
	Côtes-d'Armor	229	1,4	1,4 [1,2-1,5]	391	2,4	2,3 [2,1-2,5]	620	1,9	1,8 [1,7-2,0]
<i>Nouvelle-Aquitaine</i>		<i>3 171</i>	<i>2,0</i>	<i>1,9 [1,8-1,9]</i>	<i>6 147</i>	<i>3,7</i>	<i>3,6 [3,5-3,6]</i>	<i>9 318</i>	<i>2,8</i>	<i>2,7 [2,7-2,8]</i>
	Lot-et-Garonne	152	1,7	1,6 [1,4-1,9]	280	3,1	2,9 [2,6-3,2]	432	2,4	2,3 [2,1-2,5]

Taux d'incidence départementaux, bruts et standardisés\*, des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien chez les 20-64 ans, selon le sexe, France métropolitaine, 2014

Région	département de résidence	Effectif Hommes	Incidence brute % Hommes	Inc Stand % Hommes [IC95%]	Effectif Femmes	Incidence brute % Femmes	Inc Stand % Femmes [IC95%]	Effectif Ensemble	Incidence brute % Ensemble	Inc Stand % Ensemble [IC95%]
	Charente-Maritime	331	2,0	1,9 [1,6-2,1]	727	4,1	3,9 [3,6-4,2]	1 058	3,1	2,9 [2,7-3,1]
	Charente	213	2,2	2,1 [1,8-2,3]	402	4,0	3,8 [3,4-4,1]	615	3,1	2,9 [2,7-3,2]
	Landes	241	2,2	2,0 [1,8-2,3]	403	3,6	3,4 [3,0-3,7]	644	2,9	2,7 [2,5-2,9]
	Vienne	260	2,2	2,2 [1,9-2,4]	509	4,1	4,1 [3,8-4,5]	769	3,2	3,2 [2,9-3,4]
	Haute-Vienne	130	1,3	1,2 [1,0-1,4]	238	2,2	2,2 [1,9-2,5]	368	1,8	1,7 [1,5-1,9]
	Deux-Sèvres	240	2,3	2,2 [1,9-2,5]	450	4,4	4,2 [3,8-4,6]	690	3,4	3,2 [3,0-3,4]
	Gironde	791	1,8	1,8 [1,7-2,0]	1 619	3,5	3,6 [3,4-3,8]	2 410	2,7	2,7 [2,6-2,9]
	Pyrénées-Atlantiques	359	1,9	1,9 [1,7-2,1]	702	3,7	3,5 [3,3-3,8]	1 061	2,8	2,7 [2,5-2,9]
	Dordogne	223	2,0	1,8 [1,6-2,1]	383	3,4	3,1 [2,8-3,4]	606	2,7	2,5 [2,3-2,7]
	Creuse	57	1,8	1,6 [1,1-2,0]	112	3,6	3,2 [2,6-3,8]	169	2,6	2,4 [2,0-2,7]
	Corrèze	174	2,7	2,5 [2,1-2,9]	322	5,0	4,6 [4,1-5,1]	496	3,8	3,6 [3,2-3,9]
<i>Occitanie</i>		2 140	1,3	1,3 [1,3-1,4]	4 269	2,6	2,5 [2,5-2,6]	6 409	2,0	1,9 [1,9-2,0]
	Lozère	45	2,1	2,0 [1,4-2,5]	81	3,9	3,8 [2,9-4,6]	126	3,0	2,8 [2,3-3,3]
	Lot	81	1,8	1,6 [1,2-1,9]	151	3,3	3,0 [2,5-3,4]	232	2,5	2,3 [2,0-2,6]
	Aveyron	113	1,5	1,4 [1,1-1,6]	273	3,7	3,4 [3,0-3,8]	386	2,6	2,4 [2,2-2,6]
	Hérault	367	1,2	1,2 [1,1-1,3]	808	2,5	2,5 [2,3-2,7]	1 175	1,8	1,9 [1,8-2,0]
	Aude	176	1,8	1,7 [1,4-1,9]	363	3,6	3,4 [3,0-3,7]	539	2,7	2,6 [2,3-2,8]
	Tarn-et-Garonne	133	1,9	1,8 [1,5-2,1]	272	3,9	3,7 [3,3-4,1]	405	2,9	2,8 [2,5-3,0]
	Tarn	172	1,7	1,6 [1,3-1,8]	325	3,1	2,9 [2,6-3,2]	497	2,4	2,2 [2,0-2,4]
	Gers	108	2,1	1,9 [1,5-2,2]	166	3,2	2,9 [2,5-3,4]	274	2,7	2,4 [2,1-2,7]
	Haute-Garonne	368	0,9	1,0 [0,9-1,1]	745	1,9	2,0 [1,9-2,1]	1 113	1,4	1,5 [1,4-1,6]
	Ariège	71	1,7	1,5 [1,2-1,9]	97	2,3	2,1 [1,7-2,6]	168	2,0	1,8 [1,6-2,1]

Taux d'incidence départementaux, bruts et standardisés\*, des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien chez les 20-64 ans, selon le sexe, France métropolitaine, 2014

Région	département de résidence	Effectif Hommes	Incidence brute % Hommes	Inc Stand % Hommes [IC95%]	Effectif Femmes	Incidence brute % Femmes	Inc Stand % Femmes [IC95%]	Effectif Ensemble	Incidence brute % Ensemble	Inc Stand % Ensemble [IC95%]
	Gard	259	1,3	1,2 [1,1-1,4]	483	2,3	2,2 [2,0-2,4]	742	1,8	1,7 [1,6-1,8]
	Pyrénées-Orientales	145	1,2	1,1 [1,0-1,3]	306	2,4	2,3 [2,0-2,5]	451	1,8	1,7 [1,6-1,9]
	Hautes-Pyrénées	102	1,7	1,6 [1,3-1,9]	199	3,2	2,9 [2,5-3,3]	301	2,4	2,3 [2,0-2,5]
<i>Auvergne-Rhône-Alpes</i>		3 346	1,5	1,5 [1,5-1,6]	6 794	3,0	3,0 [3,0-3,1]	10 140	2,3	2,3 [2,2-2,3]
	Haute-Loire	109	1,7	1,6 [1,3-1,9]	208	3,4	3,2 [2,7-3,6]	317	2,5	2,4 [2,1-2,6]
	Ain	307	1,7	1,7 [1,5-1,9]	589	3,3	3,2 [2,9-3,5]	896	2,5	2,4 [2,3-2,6]
	Cantal	113	2,8	2,6 [2,1-3,1]	184	4,6	4,3 [3,6-4,9]	297	3,7	3,4 [3,0-3,8]
	Loire	291	1,4	1,4 [1,2-1,6]	576	2,7	2,7 [2,5-2,9]	867	2,1	2,1 [1,9-2,2]
	Isère	550	1,5	1,6 [1,4-1,7]	1 125	3,1	3,2 [3,0-3,3]	1 675	2,3	2,4 [2,3-2,5]
	Haute-Savoie	324	1,4	1,4 [1,3-1,6]	679	2,9	2,9 [2,7-3,1]	1 003	2,1	2,2 [2,1-2,3]
	Savoie	168	1,4	1,3 [1,1-1,5]	334	2,7	2,6 [2,4-2,9]	502	2,0	2,0 [1,8-2,2]
	Ardèche	180	2,0	1,9 [1,6-2,2]	312	3,5	3,3 [2,9-3,7]	492	2,8	2,6 [2,4-2,9]
	Rhône	471	0,9	1,0 [0,9-1,1]	1 214	2,3	2,5 [2,3-2,6]	1 685	1,6	1,8 [1,7-1,8]
	Drôme	264	1,9	1,9 [1,6-2,1]	468	3,3	3,2 [2,9-3,5]	732	2,6	2,6 [2,4-2,7]
	Puy-de-Dôme	329	1,8	1,8 [1,6-2,0]	682	3,6	3,6 [3,4-3,9]	1 011	2,7	2,7 [2,5-2,9]
	Allier	240	2,6	2,5 [2,2-2,8]	423	4,5	4,2 [3,8-4,6]	663	3,6	3,4 [3,1-3,6]
<i>PACA</i>		1 896	1,4	1,4 [1,3-1,4]	4 018	2,8	2,7 [2,7-2,8]	5 914	2,1	2,1 [2,0-2,1]
	Bouches-du-Rhône	690	1,2	1,3 [1,2-1,4]	1 605	2,7	2,7 [2,6-2,9]	2 295	2,0	2,0 [1,9-2,1]
	Vaucluse	293	2,0	1,9 [1,7-2,1]	560	3,5	3,4 [3,1-3,7]	853	2,8	2,7 [2,5-2,9]
	Var	488	1,8	1,7 [1,6-1,9]	913	3,2	3,0 [2,8-3,2]	1 401	2,5	2,4 [2,3-2,5]
	Alpes-Maritimes	288	1,0	1,0 [0,9-1,1]	662	2,1	2,1 [1,9-2,2]	950	1,6	1,5 [1,4-1,6]
	Hautes-Alpes	64	1,6	1,5 [1,2-1,9]	144	3,7	3,4 [2,9-4,0]	208	2,7	2,5 [2,1-2,8]

Taux d'incidence départementaux, bruts et standardisés*, des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien chez les 20-64 ans, selon le sexe, France métropolitaine, 2014										
Région	département de résidence	Effectif Hommes	Incidence brute % Hommes	Inc Stand % Hommes [IC95%]	Effectif Femmes	Incidence brute % Femmes	Inc Stand % Femmes [IC95%]	Effectif Ensemble	Incidence brute % Ensemble	Inc Stand % Ensemble [IC95%]
	Alpes-de-Haute-Provence	73	1,7	1,5 [1,2-1,9]	134	3,0	2,7 [2,3-3,2]	207	2,3	2,1 [1,9-2,4]
Corse		97	1,0	1,0 [0,8-1,2]	201	2,1	2,1 [1,8-2,3]	298	1,6	1,5 [1,4-1,7]
	Haute-Corse	55	1,1	1,1 [0,8-1,4]	92	1,8	1,8 [1,4-2,1]	147	1,5	1,4 [1,2-1,7]
	Corse-du-Sud	42	1,0	0,9 [0,7-1,2]	109	2,4	2,4 [1,9-2,8]	151	1,7	1,7 [1,4-1,9]

\*Standardisation sur l'âge de la population française, restreinte aux hommes ou aux femmes en fonction du sexe considéré

**Sources :** Santé publique France – 28 Décembre 2016 – Données issues de la base nationale du PMSI gérée par l'Atih. N° d'agrément 2015 – 111111 – 59 – 50.