

Comparaison des taux d'incidence régionaux standardisés* des cas chirurgicaux de syndrome du canal carpien au taux d'incidence national, selon le sexe, tous âges, France métropolitaine, 2014						
Régions	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
Auvergne-Rhône-Alpes	1,00	[0,97-1,02]	0,96	[0,94-0,98]	0,97	[0,96-0,99]
Bourgogne-Franche-Comté	1,22	[1,18-1,27]	1,17	[1,14-1,21]	1,19	[1,16-1,22]
Bretagne	0,81	[0,77-0,84]	0,74	[0,71-0,76]	0,76	[0,74-0,78]
Centre-Val-de-Loire	1,26	[1,21-1,32]	1,28	[1,24-1,32]	1,27	[1,24-1,30]
Corse	0,64	[0,55-0,75]	0,65	[0,58-0,73]	0,65	[0,59-0,71]
Grand-Est	1,30	[1,26-1,33]	1,29	[1,27-1,32]	1,29	[1,27-1,31]
Hauts-de-France	1,09	[1,06-1,12]	1,16	[1,13-1,18]	1,13	[1,11-1,15]
Ile-de-France	0,63	[0,61-0,65]	0,77	[0,76-0,79]	0,72	[0,71-0,74]
Normandie	1,19	[1,15-1,24]	1,24	[1,21-1,28]	1,23	[1,20-1,25]
Nouvelle-Aquitaine	1,21	[1,18-1,24]	1,12	[1,10-1,15]	1,16	[1,14-1,17]
Occitanie	0,91	[0,88-0,93]	0,84	[0,82-0,87]	0,87	[0,85-0,88]
PACA	0,88	[0,85-0,91]	0,89	[0,86-0,91]	0,89	[0,87-0,91]
Pays de la Loire	1,17	[1,13-1,22]	1,06	[1,03-1,09]	1,10	[1,07-1,12]

CMF = Comparative Morbidity Figure

*Standardisation sur l'âge de la population française, restreinte aux hommes ou aux femmes en fonction du sexe considéré

Sources :

Santé publique France – 28 Décembre 2016 –

Données issues de la base nationale du PMSI gérée par l'Atih. N° d'agrément 2015 – 111111 – 59 – 50.