

Comparaison des taux d'incidence départementaux standardisés* des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien au taux d'incidence national, selon le sexe, tous âges, France métropolitaine, 2014						
département de résidence	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
Ain	1,13	[1,04-1,24]	1,07	[1,00-1,15]	1,09	[1,03-1,15]
Aisne	1,43	[1,31-1,55]	1,33	[1,25-1,42]	1,36	[1,30-1,44]
Allier	1,40	[1,26-1,55]	1,23	[1,13-1,34]	1,29	[1,21-1,37]
Alpes-de-Haute-Provence	0,92	[0,76-1,10]	0,89	[0,78-1,02]	0,90	[0,80-1,00]
Hautes-Alpes	0,98	[0,81-1,18]	1,05	[0,91-1,20]	1,02	[0,91-1,14]
Alpes-Maritimes	0,63	[0,58-0,69]	0,69	[0,65-0,73]	0,68	[0,64-0,71]
Ardèche	1,13	[1,01-1,28]	1,00	[0,91-1,10]	1,05	[0,97-1,13]
Ardennes	1,17	[1,03-1,33]	1,07	[0,97-1,19]	1,10	[1,02-1,19]
Ariège	0,99	[0,82-1,18]	0,74	[0,64-0,87]	0,83	[0,74-0,93]
Aube	1,45	[1,30-1,62]	1,38	[1,27-1,50]	1,40	[1,31-1,50]
Aude	1,05	[0,94-1,18]	1,04	[0,95-1,13]	1,05	[0,98-1,12]
Aveyron	0,89	[0,78-1,02]	1,07	[0,97-1,18]	1,00	[0,92-1,08]
Bouches-du-Rhône	0,83	[0,78-0,88]	0,89	[0,86-0,93]	0,88	[0,85-0,91]
Calvados	1,30	[1,20-1,40]	1,34	[1,27-1,42]	1,33	[1,27-1,39]
Cantal	1,51	[1,30-1,75]	1,18	[1,04-1,34]	1,29	[1,17-1,42]
Charente	1,25	[1,13-1,40]	1,11	[1,02-1,21]	1,16	[1,09-1,24]
Charente-Maritime	1,25	[1,16-1,36]	1,25	[1,18-1,33]	1,25	[1,19-1,31]
Cher	1,22	[1,09-1,37]	1,15	[1,06-1,26]	1,18	[1,10-1,26]
Corrèze	1,53	[1,36-1,72]	1,37	[1,24-1,50]	1,42	[1,32-1,53]
Côte-d'Or	0,97	[0,87-1,07]	0,88	[0,81-0,95]	0,91	[0,85-0,97]
Côtes-d'Armor	0,87	[0,79-0,96]	0,77	[0,72-0,84]	0,81	[0,76-0,86]
Creuse	0,90	[0,73-1,12]	0,95	[0,81-1,11]	0,93	[0,82-1,05]
Dordogne	1,16	[1,05-1,28]	1,00	[0,92-1,09]	1,06	[0,99-1,13]
Doubs	0,93	[0,84-1,03]	1,03	[0,95-1,11]	0,99	[0,93-1,05]
Drôme	1,17	[1,06-1,28]	1,01	[0,93-1,09]	1,06	[1,00-1,13]
Eure	1,31	[1,21-1,43]	1,29	[1,21-1,37]	1,29	[1,23-1,36]
Eure-et-Loir	1,21	[1,09-1,33]	1,32	[1,23-1,42]	1,28	[1,20-1,35]
Finistère	0,80	[0,73-0,87]	0,69	[0,65-0,74]	0,73	[0,69-0,76]
Corse-du-Sud	0,65	[0,51-0,81]	0,77	[0,66-0,89]	0,72	[0,64-0,82]
Haute-Corse	0,64	[0,52-0,79]	0,54	[0,46-0,65]	0,58	[0,50-0,66]
Gard	0,79	[0,72-0,87]	0,71	[0,66-0,76]	0,74	[0,70-0,78]

Comparaison des taux d'incidence départementaux standardisés* des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien au taux d'incidence national, selon le sexe, tous âges, France métropolitaine, 2014						
département de résidence	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
Haute-Garonne	0,77	[0,71-0,83]	0,69	[0,65-0,74]	0,72	[0,68-0,75]
Gers	1,14	[0,98-1,32]	0,96	[0,85-1,09]	1,02	[0,93-1,13]
Gironde	1,17	[1,10-1,23]	1,14	[1,10-1,19]	1,15	[1,11-1,19]
Hérault	0,86	[0,80-0,93]	0,82	[0,78-0,87]	0,84	[0,81-0,88]
Ille-et-Vilaine	0,82	[0,75-0,89]	0,78	[0,74-0,84]	0,79	[0,75-0,83]
Indre	1,49	[1,32-1,68]	1,40	[1,27-1,53]	1,42	[1,32-1,53]
Indre-et-Loire	1,07	[0,98-1,17]	1,11	[1,04-1,19]	1,10	[1,04-1,16]
Isère	1,10	[1,03-1,17]	1,04	[0,99-1,09]	1,06	[1,02-1,10]
Jura	1,34	[1,19-1,51]	1,34	[1,22-1,47]	1,33	[1,24-1,43]
Landes	1,30	[1,18-1,43]	1,06	[0,98-1,15]	1,14	[1,08-1,22]
Loir-et-Cher	1,52	[1,37-1,68]	1,46	[1,35-1,58]	1,48	[1,39-1,57]
Loire	0,86	[0,78-0,94]	0,83	[0,77-0,88]	0,84	[0,79-0,88]
Haute-Loire	1,00	[0,86-1,16]	0,92	[0,82-1,04]	0,94	[0,86-1,04]
Loire-Atlantique	0,88	[0,82-0,94]	0,80	[0,76-0,85]	0,83	[0,79-0,87]
Loiret	1,28	[1,18-1,38]	1,35	[1,27-1,43]	1,32	[1,26-1,39]
Lot	1,03	[0,87-1,21]	0,98	[0,87-1,12]	1,00	[0,90-1,10]
Lot-et-Garonne	1,12	[0,99-1,25]	0,98	[0,89-1,07]	1,03	[0,96-1,11]
Lozère	1,14	[0,90-1,45]	1,06	[0,88-1,29]	1,08	[0,93-1,25]
Maine-et-Loire	1,45	[1,36-1,56]	1,24	[1,18-1,31]	1,32	[1,26-1,37]
Manche	1,08	[0,98-1,19]	1,12	[1,04-1,20]	1,10	[1,04-1,16]
Marne	1,40	[1,29-1,52]	1,44	[1,35-1,53]	1,42	[1,36-1,50]
Haute-Marne	1,92	[1,70-2,17]	1,43	[1,28-1,59]	1,60	[1,48-1,73]
Mayenne	1,42	[1,28-1,59]	1,27	[1,17-1,39]	1,32	[1,23-1,41]
Meurthe-et-Moselle	1,25	[1,15-1,35]	1,23	[1,16-1,31]	1,24	[1,18-1,30]
Meuse	1,51	[1,32-1,72]	1,65	[1,50-1,82]	1,59	[1,47-1,72]
Morbihan	0,77	[0,70-0,84]	0,71	[0,66-0,76]	0,73	[0,69-0,77]
Moselle	1,14	[1,07-1,22]	1,19	[1,13-1,25]	1,17	[1,13-1,22]
Nièvre	1,40	[1,23-1,59]	1,37	[1,25-1,52]	1,38	[1,28-1,49]
Nord	0,93	[0,88-0,98]	1,04	[1,00-1,07]	1,00	[0,97-1,03]
Oise	1,01	[0,92-1,10]	1,07	[1,00-1,13]	1,04	[0,99-1,09]
Orne	1,19	[1,05-1,34]	1,17	[1,06-1,28]	1,17	[1,09-1,26]
Pas-de-Calais	1,07	[1,00-1,13]	1,19	[1,14-1,24]	1,15	[1,11-1,19]
Puy-de-Dôme	1,09	[1,00-1,19]	1,11	[1,04-1,19]	1,10	[1,05-1,16]
Pyrénées-Atlantiques	1,21	[1,12-1,31]	1,14	[1,07-1,21]	1,16	[1,11-1,22]
Hauts-Pyrénées	1,07	[0,93-1,23]	0,98	[0,88-1,09]	1,01	[0,93-1,10]
Pyrénées-Orientales	0,84	[0,75-0,94]	0,80	[0,73-0,87]	0,82	[0,76-0,88]
Bas-Rhin	1,38	[1,30-1,47]	1,41	[1,35-1,47]	1,40	[1,35-1,45]
Haut-Rhin	1,08	[1,00-1,17]	1,26	[1,19-1,33]	1,19	[1,14-1,25]

Comparaison des taux d'incidence départementaux standardisés* des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien au taux d'incidence national, selon le sexe, tous âges, France métropolitaine, 2014						
département de résidence	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
Rhône	0,72	[0,67-0,77]	0,82	[0,78-0,86]	0,79	[0,76-0,82]
Haute-Saône	1,15	[1,00-1,32]	1,20	[1,08-1,33]	1,18	[1,08-1,27]
Saône-et-Loire	1,37	[1,26-1,48]	1,22	[1,15-1,30]	1,27	[1,21-1,34]
Sarthe	1,48	[1,37-1,61]	1,44	[1,35-1,52]	1,45	[1,38-1,52]
Savoie	0,93	[0,83-1,05]	0,88	[0,81-0,97]	0,90	[0,84-0,96]
Haute-Savoie	1,04	[0,95-1,13]	0,99	[0,93-1,06]	1,01	[0,96-1,06]
Paris	0,41	[0,38-0,45]	0,55	[0,52-0,58]	0,51	[0,49-0,53]
Seine-Maritime	1,13	[1,06-1,21]	1,25	[1,20-1,31]	1,21	[1,17-1,26]
Seine-et-Marne	0,92	[0,85-0,98]	1,02	[0,97-1,07]	0,98	[0,94-1,02]
Yvelines	0,79	[0,73-0,85]	0,98	[0,93-1,02]	0,91	[0,87-0,95]
Deux-Sèvres	1,43	[1,30-1,58]	1,32	[1,22-1,42]	1,35	[1,27-1,44]
Somme	1,64	[1,52-1,78]	1,57	[1,48-1,66]	1,59	[1,52-1,67]
Tarn	1,10	[0,98-1,23]	0,94	[0,86-1,03]	1,00	[0,93-1,07]
Tarn-et-Garonne	1,26	[1,11-1,43]	1,19	[1,08-1,31]	1,21	[1,12-1,31]
Var	1,03	[0,96-1,10]	0,95	[0,90-1,00]	0,98	[0,94-1,02]
Vaucluse	1,21	[1,10-1,32]	1,11	[1,03-1,18]	1,14	[1,08-1,21]
Vendée	1,04	[0,96-1,14]	0,93	[0,87-1,00]	0,97	[0,92-1,02]
Vienne	1,43	[1,30-1,57]	1,34	[1,25-1,44]	1,37	[1,30-1,45]
Haute-Vienne	0,76	[0,67-0,87]	0,68	[0,62-0,76]	0,71	[0,66-0,77]
Vosges	1,44	[1,31-1,59]	1,10	[1,01-1,19]	1,22	[1,14-1,30]
Yonne	1,73	[1,58-1,90]	1,55	[1,44-1,67]	1,61	[1,52-1,70]
Territoire de Belfort	1,01	[0,83-1,23]	1,08	[0,94-1,24]	1,05	[0,94-1,18]
Essonne	0,88	[0,82-0,95]	0,90	[0,85-0,95]	0,89	[0,85-0,93]
Hauts-de-Seine	0,38	[0,34-0,42]	0,53	[0,49-0,56]	0,48	[0,45-0,51]
Seine-Saint-Denis	0,48	[0,44-0,53]	0,69	[0,65-0,73]	0,61	[0,58-0,64]
Val-de-Marne	0,67	[0,62-0,73]	0,86	[0,82-0,91]	0,80	[0,76-0,84]
Val-d'Oise	0,68	[0,62-0,74]	0,86	[0,81-0,91]	0,80	[0,76-0,83]

*Standardisation sur l'âge de la population française, restreinte aux hommes ou aux femmes en fonction du sexe considéré

CMF = Comparative Morbidity Figure

Sources :

Santé publique France – 28 Décembre 2016 –

Données issues de la base nationale du PMSI gérée par l'Atih. N° d'agrément 2015 – 111111 – 59 – 50.