

Comparaison des taux d'incidence départementaux standardisés* des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien au taux d'incidence national, selon le sexe, chez les 20-64 ans, France métropolitaine, 2014						
département de résidence	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
Ain	1,13	[1,01-1,26]	1,05	[0,97-1,14]	1,07	[1,00-1,14]
Aisne	1,51	[1,36-1,68]	1,36	[1,26-1,47]	1,41	[1,32-1,50]
Allier	1,68	[1,48-1,91]	1,38	[1,26-1,52]	1,48	[1,37-1,59]
Alpes-de-Haute-Provence	1,04	[0,83-1,31]	0,90	[0,76-1,06]	0,94	[0,82-1,08]
Hautes-Alpes	1,04	[0,81-1,33]	1,13	[0,96-1,33]	1,09	[0,95-1,25]
Alpes-Maritimes	0,66	[0,59-0,74]	0,68	[0,63-0,74]	0,68	[0,64-0,73]
Ardèche	1,30	[1,12-1,51]	1,09	[0,98-1,22]	1,15	[1,06-1,26]
Ardennes	1,30	[1,12-1,52]	1,08	[0,96-1,21]	1,15	[1,04-1,26]
Ariège	1,04	[0,82-1,32]	0,70	[0,58-0,86]	0,81	[0,70-0,94]
Aube	1,49	[1,29-1,72]	1,41	[1,27-1,56]	1,43	[1,32-1,55]
Aude	1,13	[0,98-1,31]	1,11	[1,01-1,24]	1,13	[1,03-1,23]
Aveyron	0,93	[0,77-1,12]	1,13	[1,00-1,27]	1,06	[0,95-1,17]
Bouches-du-Rhône	0,85	[0,79-0,92]	0,90	[0,86-0,94]	0,89	[0,86-0,93]
Calvados	1,27	[1,14-1,40]	1,41	[1,32-1,51]	1,37	[1,29-1,45]
Cantal	1,75	[1,45-2,12]	1,40	[1,21-1,62]	1,50	[1,34-1,69]
Charente	1,39	[1,22-1,60]	1,24	[1,12-1,37]	1,29	[1,19-1,39]
Charente-Maritime	1,25	[1,12-1,39]	1,29	[1,20-1,39]	1,28	[1,21-1,36]
Cher	1,21	[1,03-1,41]	1,11	[0,99-1,24]	1,14	[1,04-1,25]
Corrèze	1,68	[1,45-1,96]	1,52	[1,36-1,70]	1,57	[1,44-1,71]
Côte-d'Or	0,97	[0,85-1,11]	0,85	[0,77-0,93]	0,88	[0,82-0,96]
Côtes-d'Armor	0,92	[0,81-1,05]	0,76	[0,69-0,84]	0,81	[0,75-0,88]
Creuse	1,06	[0,81-1,38]	1,04	[0,86-1,25]	1,04	[0,89-1,21]
Dordogne	1,23	[1,08-1,41]	1,01	[0,91-1,12]	1,08	[1,00-1,17]
Doubs	0,85	[0,74-0,98]	1,00	[0,91-1,09]	0,95	[0,88-1,02]
Drôme	1,26	[1,12-1,42]	1,06	[0,96-1,16]	1,12	[1,04-1,21]
Eure	1,31	[1,18-1,46]	1,32	[1,23-1,42]	1,31	[1,24-1,40]
Eure-et-Loir	1,20	[1,06-1,37]	1,32	[1,21-1,45]	1,28	[1,19-1,38]
Finistère	0,81	[0,72-0,90]	0,66	[0,61-0,72]	0,71	[0,66-0,76]
Corse-du-Sud	0,64	[0,47-0,86]	0,78	[0,64-0,94]	0,73	[0,63-0,86]
Haute-Corse	0,73	[0,56-0,95]	0,59	[0,48-0,72]	0,63	[0,54-0,74]
Gard	0,84	[0,74-0,95]	0,71	[0,65-0,78]	0,76	[0,70-0,81]
Haute-Garonne	0,69	[0,62-0,77]	0,66	[0,61-0,71]	0,67	[0,63-0,71]
Gers	1,27	[1,05-1,54]	0,96	[0,83-1,12]	1,06	[0,94-1,20]

Comparaison des taux d'incidence départementaux standardisés* des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien au taux d'incidence national, selon le sexe, chez les 20-64 ans, France métropolitaine, 2014						
département de résidence	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
Gironde	1,25	[1,16-1,34]	1,18	[1,13-1,24]	1,21	[1,16-1,26]
Hérault	0,83	[0,75-0,92]	0,82	[0,77-0,88]	0,83	[0,78-0,88]
Ille-et-Vilaine	0,79	[0,71-0,88]	0,76	[0,70-0,82]	0,76	[0,72-0,81]
Indre	1,51	[1,28-1,77]	1,46	[1,30-1,64]	1,47	[1,34-1,61]
Indre-et-Loire	1,02	[0,90-1,15]	1,18	[1,09-1,27]	1,13	[1,05-1,20]
Isère	1,06	[0,98-1,16]	1,04	[0,98-1,10]	1,04	[0,99-1,09]
Jura	1,35	[1,15-1,59]	1,40	[1,25-1,56]	1,37	[1,25-1,50]
Landes	1,37	[1,21-1,56]	1,11	[1,00-1,22]	1,19	[1,10-1,29]
Loir-et-Cher	1,54	[1,35-1,76]	1,48	[1,35-1,63]	1,50	[1,39-1,62]
Loire	0,94	[0,84-1,05]	0,89	[0,82-0,97]	0,91	[0,85-0,97]
Haute-Loire	1,08	[0,90-1,31]	1,04	[0,91-1,19]	1,04	[0,93-1,17]
Loire-Atlantique	0,86	[0,79-0,94]	0,79	[0,74-0,85]	0,81	[0,77-0,86]
Loiret	1,24	[1,12-1,38]	1,27	[1,18-1,37]	1,26	[1,19-1,34]
Lot	1,05	[0,84-1,32]	0,97	[0,83-1,14]	1,00	[0,87-1,14]
Lot-et-Garonne	1,10	[0,93-1,29]	0,95	[0,85-1,07]	1,00	[0,91-1,10]
Lozère	1,32	[0,98-1,77]	1,24	[1,00-1,54]	1,25	[1,04-1,48]
Maine-et-Loire	1,52	[1,39-1,66]	1,22	[1,14-1,31]	1,32	[1,25-1,39]
Manche	1,12	[0,99-1,27]	1,16	[1,06-1,26]	1,14	[1,06-1,22]
Marne	1,43	[1,29-1,59]	1,50	[1,40-1,61]	1,48	[1,39-1,57]
Haute-Marne	1,94	[1,65-2,28]	1,50	[1,32-1,71]	1,64	[1,48-1,81]
Mayenne	1,56	[1,36-1,79]	1,40	[1,26-1,55]	1,44	[1,33-1,57]
Meurthe-et-Moselle	1,27	[1,15-1,41]	1,23	[1,14-1,32]	1,24	[1,17-1,31]
Meuse	1,58	[1,33-1,87]	1,67	[1,48-1,88]	1,62	[1,47-1,79]
Morbihan	0,71	[0,62-0,81]	0,67	[0,61-0,74]	0,68	[0,63-0,73]
Moselle	1,14	[1,05-1,24]	1,14	[1,07-1,21]	1,13	[1,08-1,19]
Nièvre	1,47	[1,24-1,74]	1,47	[1,30-1,66]	1,46	[1,33-1,61]
Nord	0,88	[0,82-0,94]	0,99	[0,95-1,03]	0,95	[0,92-0,99]
Oise	0,97	[0,87-1,08]	1,10	[1,02-1,17]	1,05	[0,99-1,11]
Orne	1,24	[1,05-1,46]	1,26	[1,12-1,40]	1,24	[1,14-1,36]
Pas-de-Calais	1,17	[1,09-1,26]	1,28	[1,22-1,34]	1,24	[1,19-1,29]
Puy-de-Dôme	1,19	[1,07-1,33]	1,19	[1,11-1,29]	1,19	[1,12-1,26]
Pyrénées-Atlantiques	1,26	[1,13-1,39]	1,16	[1,08-1,25]	1,19	[1,12-1,26]
Hauts-Pyrénées	1,06	[0,87-1,29]	0,96	[0,83-1,10]	0,99	[0,89-1,11]
Pyrénées-Orientales	0,77	[0,66-0,91]	0,74	[0,66-0,83]	0,76	[0,69-0,83]
Bas-Rhin	1,32	[1,22-1,43]	1,33	[1,26-1,40]	1,32	[1,26-1,38]
Haut-Rhin	1,02	[0,92-1,13]	1,20	[1,13-1,29]	1,14	[1,08-1,21]
Rhône	0,69	[0,63-0,75]	0,81	[0,77-0,86]	0,78	[0,74-0,81]
Haute-Saône	1,05	[0,87-1,27]	1,24	[1,10-1,40]	1,17	[1,06-1,30]

Comparaison des taux d'incidence départementaux standardisés* des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien au taux d'incidence national, selon le sexe, chez les 20-64 ans, France métropolitaine, 2014						
département de résidence	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
Saône-et-Loire	1,51	[1,36-1,67]	1,26	[1,16-1,36]	1,33	[1,25-1,42]
Sarthe	1,56	[1,40-1,72]	1,53	[1,43-1,65]	1,54	[1,45-1,63]
Savoie	0,90	[0,78-1,05]	0,87	[0,78-0,97]	0,88	[0,80-0,96]
Haute-Savoie	0,97	[0,87-1,09]	0,96	[0,89-1,03]	0,96	[0,90-1,02]
Paris	0,33	[0,30-0,37]	0,45	[0,42-0,48]	0,42	[0,39-0,44]
Seine-Maritime	1,12	[1,04-1,22]	1,24	[1,17-1,30]	1,21	[1,15-1,26]
Seine-et-Marne	0,83	[0,76-0,91]	1,02	[0,97-1,08]	0,96	[0,92-1,01]
Yvelines	0,79	[0,72-0,87]	0,94	[0,89-0,99]	0,89	[0,85-0,94]
Deux-Sèvres	1,50	[1,32-1,71]	1,37	[1,25-1,51]	1,41	[1,31-1,52]
Somme	1,86	[1,70-2,04]	1,66	[1,55-1,77]	1,72	[1,63-1,82]
Tarn	1,07	[0,92-1,24]	0,94	[0,85-1,05]	0,98	[0,90-1,08]
Tarn-et-Garonne	1,23	[1,04-1,46]	1,21	[1,08-1,37]	1,22	[1,10-1,34]
Var	1,15	[1,05-1,26]	1,00	[0,93-1,06]	1,05	[1,00-1,11]
Vaucluse	1,28	[1,14-1,43]	1,12	[1,03-1,22]	1,18	[1,10-1,26]
Vendée	1,03	[0,92-1,16]	0,91	[0,84-1,00]	0,95	[0,88-1,02]
Vienne	1,45	[1,29-1,64]	1,35	[1,24-1,48]	1,39	[1,29-1,49]
Haute-Vienne	0,83	[0,70-0,99]	0,72	[0,64-0,82]	0,76	[0,69-0,84]
Vosges	1,39	[1,22-1,58]	1,09	[0,98-1,21]	1,18	[1,09-1,28]
Yonne	1,84	[1,63-2,08]	1,63	[1,50-1,79]	1,69	[1,58-1,82]
Territoire de Belfort	1,04	[0,81-1,33]	1,01	[0,84-1,20]	1,01	[0,88-1,17]
Essonne	0,80	[0,73-0,89]	0,85	[0,79-0,90]	0,83	[0,79-0,88]
Hauts-de-Seine	0,28	[0,24-0,32]	0,45	[0,41-0,48]	0,40	[0,37-0,43]
Seine-Saint-Denis	0,47	[0,42-0,53]	0,68	[0,64-0,73]	0,61	[0,58-0,65]
Val-de-Marne	0,61	[0,54-0,67]	0,81	[0,76-0,86]	0,75	[0,71-0,79]
Val-d'Oise	0,67	[0,60-0,75]	0,92	[0,86-0,98]	0,84	[0,80-0,89]

*Standardisation sur l'âge de la population française, restreinte aux hommes ou aux femmes en fonction du sexe considéré

CMF = Comparative Morbidity Figure

Sources :

Santé publique France – 28 Décembre 2016 –

Données issues de la base nationale du PMSI gérée par l'Atih. N° d'agrément 2015 – 111111 – 59 – 50.