

Annexes

Annexe 1 : Nombre de découvertes de séropositivité VIH par année de diagnostic, chez les adultes et les enfants, par sexe et par mode de contamination	141
Annexe 2 : Indicateurs régionaux du nombre de découvertes de séropositivité VIH	142
Annexe 3 : Nombre de découvertes de séropositivité VIH par semestre de diagnostic, selon la région de domicile (France, données au 31/03/2006, redressées pour les délais de déclaration)	143
Annexe 4 : Nombre de découvertes de séropositivité chez les enfants par mode de contamination de l'enfant et pour les transmissions mère-enfant, par mode de contamination de la mère (France, données au 31/03/2006)	146
Annexe 5 : Circuit des notifications obligatoires d'infection par le VIH	147
Annexe 6 : Indicateurs régionaux du nombre de cas de sida	148
Annexe 7 : Nombre de cas de sida par année de diagnostic, nombre de décès par année de décès et nombre cumulé de vivants au 31 décembre de chaque année, par région de domicile (France, données au 31/03/2006 redressées pour les délais de déclaration)	150
Annexe 8 : Cas de sida par mode de contamination, sexe et année de diagnostic (France, données au 31/03/2006)	153
Annexe 9 : Cas de sida pédiatriques (France, données au 31/03/2006)	154
Annexe 10 : Fréquence des pathologies opportunistes parmi les cas de sida adultes par année de diagnostic de 2003 à 2005 selon qu'ils ont bénéficié d'un traitement antirétroviral pré-sida ou qu'ils ont eu un diagnostic simultané de séropositivité et de sida (France, données du 31 mars 2006)	155

Annexe 1 - Nombre de découvertes de séropositivité VIH

par année de diagnostic, chez les adultes et les enfants, par sexe et par mode de contamination

NOMBRE DE DÉCOUVERTES DE SÉROPOSITIVITÉ PAR ANNÉE DE DIAGNOSTIC CHEZ LES ADULTES ET LES ENFANTS (FRANCE, DONNÉES AU 31/03/2006)

	Année de diagnostic			Total
	2003	2004	2005	
Adultes et adolescents	3 829	4 229	3 885	11 943
Enfants de moins de 13 ans	33	36	25	94
Total	3 862	4 265	3 910	12 037

Données 2004-2005 provisoires non redressées pour les délais de déclaration.

NOMBRE DE DÉCOUVERTES DE SÉROPOSITIVITÉ PAR ANNÉE DE DIAGNOSTIC PAR SEXE (FRANCE, DONNÉES AU 31/03/2006)

Sexe	Année de diagnostic			Total
	2003	2004	2005	
Femmes	1 633	1 752	1 479	4 864
Hommes	2 229	2 513	2 431	7 173
Total	3 862	4 265	3 910	12 037

Données 2004-2005 provisoires non redressées pour les délais de déclaration.

NOMBRE DE DÉCOUVERTES DE SÉROPOSITIVITÉ PAR ANNÉE DE DIAGNOSTIC PAR MODE CONTAMINATION (FRANCE, DONNÉES AU 31/03/2006)

Mode de contamination	Année de diagnostic			Total
	2003	2004	2005	
Rapports homosexuels	805	987	1 024	2 816
Usage de drogues injectables (UDI)	91	91	69	251
Rapports homosexuels et UDI	4	10	6	20
Injection de produits antihémophiliques	1	0	0	1
Rapports hétérosexuels	2 223	2 330	2 023	6 576
Transfusion	5	2	2	9
Transmission mère-enfant	32	35	23	90
Non renseigné	701	810	763	2 274
Total	3 862	4 265	3 910	12 037

Données 2004-2005 provisoires non redressées pour les délais de déclaration.

Annexe 2 - Indicateurs régionaux du nombre de découvertes de séropositivité VIH

DÉCOUVERTES DE SÉROPOSITIVITÉ VIH EN 2003-2005													
Région de domicile	Population en 2004	Nombre de cas		Taux annuel par million d'hab. ^b	Sexe et âge		Mode de contamination			% de séropositivité au stade sida	Surveillance virologique % d'infections récentes (≤ 6 mois)	% de sérotypes non-B parmi les VIH-1	
		provisoire ^a	redressé ^b		Âge moyen	% 15-24 ans	% 60 ans et plus	% homo.	% hétéro.				% UDI
01-Alsace	1 793 859	212	219	40,7	36,4	10 %	3 %	33 %	48 %	3 %	11 %	26 %	44 %
02-Aquitaine	3 044 636	344	357	39,0	37,3	14 %	7 %	36 %	43 %	3 %	19 %	31 %	29 %
03-Auvergne	1 326 406	114	116	29,2	40,3	7 %	4 %	35 %	43 %	3 %	26 %	28 %	29 %
04-Bourgogne	1 623 295	80	82	16,8	39,4	10 %	6 %	34 %	40 %	4 %	24 %	d	d
05-Bretagne	3 020 885	238	241	26,6	39,0	11 %	4 %	35 %	45 %	2 %	21 %	28 %	40 %
06-Centre	2 481 926	293	303	40,7	36,3	13 %	5 %	22 %	56 %	2 %	14 %	21 %	42 %
07-Champagne-Ardennes	1 336 330	132	135	33,7	36,2	11 %	3 %	24 %	56 %	2 %	14 %	37 %	39 %
08-Corse	273 060	19	c	c	40,9	5 %	5 %	16 %	32 %	5 %	32 %	d	d
09-Franche-Comté	1 138 930	84	101	29,5	39,2	7 %	6 %	38 %	39 %	5 %	7 %	31 %	25 %
10-Île-de-France	11 290 831	5 530	5 699	168,2	36,2	10 %	3 %	21 %	58 %	2 %	17 %	23 %	55 %
11-Languedoc-Roussillon	2 462 473	261	303	41,0	38,9	7 %	4 %	32 %	46 %	7 %	17 %	32 %	28 %
12-Limousin	721 618	75	c	c	39,6	4 %	9 %	36 %	44 %	1 %	21 %	d	d
13-Lorraine	2 330 504	163	167	23,9	36,3	12 %	3 %	31 %	50 %	2 %	12 %	27 %	43 %
14-Midi-Pyrénées	2 701 049	312	318	39,2	38,3	10 %	6 %	34 %	45 %	4 %	15 %	34 %	38 %
15-Nord-P.-d.-Calais	4 027 706	277	286	23,7	37,1	16 %	4 %	36 %	48 %	3 %	17 %	27 %	39 %
16-Basse-Normandie	1 441 833	58	59	13,6	40,4	10 %	5 %	22 %	50 %	3 %	19 %	33 %	45 %
17-Haute-Normandie	1 802 417	259	264	48,8	37,0	14 %	6 %	24 %	60 %	2 %	17 %	15 %	44 %
18-Pays de Loire	3 357 861	240	252	25,0	38,8	11 %	5 %	31 %	51 %	2 %	15 %	27 %	35 %
19-Picardie	1 874 601	125	127	22,5	37,1	12 %	2 %	21 %	56 %	2 %	17 %	25 %	51 %
20-Poitou-Charentes	1 691 470	128	135	26,6	37,4	14 %	6 %	38 %	48 %	1 %	24 %	22 %	39 %
21-Prov.-Alpes-C. d'Azur	4 702 555	521	569	40,3	39,2	7 %	6 %	35 %	42 %	4 %	19 %	31 %	23 %
22-Rhône-Alpes	5 895 755	669	695	39,3	38,2	9 %	5 %	31 %	47 %	2 %	21 %	24 %	38 %
971-Guadeloupe	448 000	294	335	249,4	39,6	10 %	6 %	7 %	70 %	1 %	19 %	19 %	7 %
972-Martinique	395 000	201	207	174,5	38,0	16 %	5 %	13 %	72 %	1 %	13 %	27 %	8 %
973-Guyane	184 000	422	463	838,4	35,2	15 %	4 %	4 %	73 %	1 %	20 %	d	d
974-Réunion	763 000	84	84	36,9	41,8	11 %	13 %	29 %	56 %	0 %	33 %	15 %	11 %
Totale		12 037	12 552		37,1	11 %	4 %	23 %	55 %	2 %	18 %	24 %	45 %

^a Données provisoires en raison des délais de déclaration.

^b Données redressées pour tenir compte des délais de déclaration.

^c Calculs de redressements impossibles du fait de la combinaison d'un effectif faible et de délais de déclaration irréguliers.


^d Résultats de surveillance virologique non informatifs : moins de 50 % de buvard disponibles.


^e Y compris les cas domiciliés à l'étranger et ceux dont le lieu de domicile est inconnu.


NB : Pour certaines régions, les pourcentages sont peu informatifs en raison de la faiblesse des effectifs.

Annexe 3 - Nombre de découvertes de séropositivité VIH

par semestre de diagnostic, selon la région de domicile (France, données au 31/03/2006, redressées pour les délais de déclaration)







Annexe 4 - Nombre de découvertes de séropositivité chez les enfants


par mode de contamination de l'enfant et pour les transmissions mère-enfant, par mode de contamination de la mère (France, données au 31/03/2006)

MODE DE CONTAMINATION DE L'ENFANT				
	Année de diagnostic			Total
	2003	2004	2005	
Transmission mère-enfant	29	31	20	80
Inconnu	4	5	5	14
Total	33	36	25	94

MODE DE CONTAMINATION DE LA MÈRE				
	Année de diagnostic			Total
	2003	2004	2005	
Usage de drogues injectables	0	1	0	1
Rapports hétérosexuels	13	11	7	31
Non renseigné	16	19	13	48
Total	29	31	20	80

Données 2004-2005 provisoires non redressées pour les délais de déclaration.

Annexe 5 - Circuit des notifications obligatoires d'infection par le VIH



Annexe 6 - Indicateurs régionaux du nombre de cas de sida

NOMBRE DE CAS DE SIDA, 1978-2005 ET 2003-2005

Région	Pop. 2004	Cas de sida cumulés 1978-2005		Évolution du nombre de cas diagnostiqués entre		Cas de sida diagnostiqués en 2003-2005				
		N ^a	N ^b	2000-2002	2003-2005	Nombre de cas ^b	Taux moyen annuel par million d'hab. ^b	Nombre de cas ^a	% de cas diagnostiqués chez des femmes	% de sujets ignorant leur séropositivité VIH
01-Alsace	1 793 859	690	695	5 %	30 %	57	10,6	52	33 %	40 %
02-Aquitaine	3 044 636	2 699	2 710	-22 %	-3 %	121	13,2	110	20 %	45 %
03-Auvergne	1 326 406	566	568	-8 %	-6 %	43	10,8	41	29 %	61 %
04-Bourgogne	1 623 295	628	629	-8 %	-24 %	35	7,2	34	29 %	38 %
05-Bretagne	3 020 885	1 162	1 164	9 %	-12 %	85	9,4	83	24 %	51 %
06-Centre	2 481 926	1 020	1 022	-8 %	-9 %	61	8,2	59	24 %	61 %
07-Champagne-Ardennes	1 336 330	491	497	79 %	65 %	38	9,5	32	16 %	50 %
08-Corse	273 060	264	265	-43 %	-10 %	14	17,1	13	23 %	46 %
09-Franche-Comté	1 138 930	334	338	-6 %	30 %	15	4,4	11	55 %	9 %
10-Île-de-France	11 290 831	27 554	27 633	3 %	-14 %	1 677	49,5	1 598	33 %	49 %
11-Languedoc-Roussillon	2 462 473	2 009	2 016	-17 %	6 %	77	10,4	70	24 %	46 %
12-Limousin	721 618	378	^c	-4 %	^c	^c	^c	27	30 %	56 %
13-Lorraine	2 330 504	707	708	0 %	-19 %	36	5,1	35	31 %	46 %
14-Midi-Pyrénées	2 701 049	1 942	1 944	-15 %	7 %	88	10,9	86	21 %	42 %
15-Nord-P.-d.-Calais	4 027 706	1 135	1 137	-10 %	-11 %	128	10,6	126	32 %	33 %
16-Basse-Normandie	1 441 833	601	601	-14 %	2 %	36	8,3	36	44 %	22 %
17-Haute-Normandie	1 802 417	834	836	29 %	-4 %	70	12,9	68	29 %	54 %
18-Pays de Loire	3 357 861	1 319	1 327	-17 %	-1 %	90	8,9	82	28 %	35 %
19-Picardie	1 874 601	621	625	-16 %	5 %	35	6,2	31	26 %	48 %
20-Poitou-Charentes	1 691 470	764	768	0 %	51 %	46	9,1	42	19 %	66 %
21-Prov.-Alpes-C. d'Azur	4 702 555	7 420	7 429	-10 %	-14 %	297	21,1	288	27 %	31 %
22-Rhône-Alpes	5 895 755	3 419	3 443	-2 %	6 %	294	16,6	270	28 %	45 %
971-Guadeloupe	448 000	1 193	1 208	2 %	-15 %	128	95,2	113	46 %	47 %
972-Martinique	395 000	661	671	-19 %	15 %	89	75,1	79	27 %	33 %
973-Guyane	184 000	1 101	1 111	-3 %	-3 %	178	322,5	168	43 %	47 %
974-Réunion	763 000	335	337	-8 %	-9 %	54	23,6	52	21 %	50 %
Total^d	62 130 000	61 082	61 306	-3 %	-8 %	4 026	21,6	3 802	31 %	46 %

^a Données provisoires non redressées.

^b Calculs effectués sur les données redressées.


^c Calculs de redressements impossibles du fait de la combinaison d'un effectif faible et de délais de déclaration irréguliers.











^d Y compris les cas domiciliés à l'étranger et ceux dont le lieu de domicile est inconnu.











NB : Pour certaines régions, l'interprétation des pourcentages doit se faire avec prudence en raison des petits effectifs.

Cas de sida diagnostiqués en 2003-2005									
% de sujets connaissant leur sérologie mais non traités	Répartition des cas de sida par mode de transmission			Répartition par âge			Vivants		Région
	% homo.	% toxico.	% hétéro.	% < 15 ans	% 15-24 ans	% 60 ans et +	1996	2005 ^b	
48 %	31 %	17 %	42 %	0 %	0 %	4 %	167	296	01-Alsace
47 %	34 %	18 %	34 %	0 %	5 %	8 %	714	994	02-Aquitaine
50 %	32 %	10 %	46 %	0 %	2 %	7 %	170	280	03-Auvergne
29 %	26 %	21 %	24 %	0 %	0 %	12 %	184	264	04-Bourgogne
41 %	35 %	13 %	35 %	0 %	2 %	7 %	288	488	05-Bretagne
43 %	27 %	5 %	49 %	0 %	3 %	7 %	286	463	06-Centre
50 %	50 %	0 %	41 %	0 %	3 %	13 %	138	207	07-Champagne-Ardennes
29 %	15 %	31 %	23 %	0 %	0 %	0 %	85	100	08-Corse
80 %	0 %	9 %	82 %	0 %	0 %	0 %	110	138	09-Franche-Comté
50 %	21 %	9 %	59 %	1 %	3 %	5 %	7 434	11 526	10-Île-de-France
46 %	39 %	16 %	33 %	1 %	1 %	13 %	607	853	11-Languedoc-Roussillon
42 %	37 %	19 %	33 %	0 %	4 %	15 %	148	^c	12-Limousin
68 %	29 %	6 %	49 %	0 %	0 %	9 %	214	289	13-Lorraine
46 %	33 %	10 %	44 %	0 %	2 %	5 %	828	1083	14-Midi-Pyrénées
40 %	33 %	8 %	49 %	0 %	7 %	4 %	294	554	15-Nord-P.-d.-Calais
71 %	28 %	17 %	42 %	0 %	0 %	8 %	154	229	16-Basse-Normandie
55 %	29 %	10 %	51 %	1 %	3 %	10 %	275	435	17-Haute-Normandie
60 %	35 %	10 %	39 %	0 %	1 %	7 %	310	536	18-Pays de Loire
38 %	19 %	16 %	42 %	0 %	0 %	3 %	181	271	19-Picardie
57 %	38 %	7 %	40 %	2 %	0 %	14 %	267	357	20-Poitou-Charentes
48 %	24 %	27 %	37 %	0 %	3 %	4 %	2276	3042	21-Prov.-Alpes-C. d'Azur
52 %	31 %	11 %	44 %	1 %	3 %	6 %	971	1606	22-Rhône-Alpes
59 %	8 %	4 %	74 %	1 %	2 %	9 %	312	565	971-Guadeloupe
77 %	22 %	1 %	71 %	0 %	1 %	9 %	146	310	972-Martinique
77 %	4 %	8 %	73 %	4 %	7 %	8 %	257	590	973-Guyane
77 %	44 %	8 %	48 %	0 %	2 %	8 %	76	171	974-Réunion
52 %	24 %	11 %	53 %	1 %	3 %	6 %	17 290	26 656	Total^d

Annexe 7 - Nombre de cas de sida par année de diagnostic, nombre de décès par année de décès et nombre cumulé de vivants au 31 décembre de chaque année, par région de domicile (France, données au 31/03/2006 redressées pour les délais de déclaration)







Annexe 8 - Cas de sida par mode de contamination, sexe et année de diagnostic (France, données au 31/03/2006)

ANNÉE DE DIAGNOSTIC DU SIDA												
Mode de contamination	< 1996	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004 ^a	2005 ^a	Total
Rapports homosexuels	19 439 46 %	1 483 37 %	784 34 %	588 30 %	550 30 %	492 28 %	410 25 %	395 24 %	379 26 %	287 22 %	238 23 %	25 045 41 %
Usage de drogues injectables (UDI)	9 936 24 %	975 24 %	430 19 %	357 18 %	309 17 %	246 14 %	258 15 %	204 12 %	170 12 %	155 12 %	88 9 %	13 128 21 %
Hommes	7 308	739	328	273	215	189	209	151	130	110	66	9 718
Femmes	2 628	236	102	84	94	57	49	53	40	45	22	3 410
Rapports homosexuels et UDI	550 1 %	30 1 %	9 0 %	12 1 %	7 0 %	4 0 %	6 0 %	2 0 %	6 0 %	6 0 %	7 1 %	639 1 %
Rapports hétérosexuels	7 341 17 %	1 139 28 %	805 35 %	740 38 %	732 40 %	769 44 %	790 47 %	827 51 %	730 50 %	710 54 %	569 55 %	15 152 25 %
Hommes	4 087	634	466	434	424	397	444	441	390	367	282	8 366
Femmes	3 254	505	339	306	308	372	346	386	340	343	287	6 786
Transfusion ou injection de produits antihémophiliques	2 243 5 %	90 2 %	45 2 %	26 1 %	26 1 %	18 1 %	13 1 %	15 1 %	9 1 %	7 1 %	3 0 %	2 495 4 %
Transmission materno-fœtale	586 1 %	33 1 %	17 1 %	8 0 %	8 0 %	6 0 %	7 0 %	8 0 %	9 1 %	10 1 %	7 1 %	699 1 %
Autre, inconnu	2 029 5 %	289 7 %	203 9 %	217 11 %	203 11 %	197 11 %	189 11 %	185 11 %	151 10 %	145 11 %	116 11 %	3 924 6 %
Hommes	1 615	239	177	180	174	163	147	150	119	112	90	3 166
Femmes	414	50	26	37	29	34	42	35	32	33	26	758
Total	42 124 100 %	4 039 100 %	2 293 100 %	1 948 100 %	1 835 100 %	1 732 100 %	1 673 100 %	1 636 100 %	1 454 100 %	1 320 100 %	1 028 100 %	61 082 100 %
Hommes	34 732	3 209	1 796	1 507	1 392	1 258	1 231	1 155	1 036	889	688	48 893
Femmes	7 392	830	497	441	443	474	442	481	418	431	340	12 189

^a Données provisoires non redressées pour les délais de déclaration.

Annexe 9 - Cas de sida pédiatriques (France, données au 31/03/2006)

ANNÉE DE DIAGNOSTIC		1996	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004 ^a	2005 ^a	Total
Mode de contamination	< 1996												
Injection de produits antihémophiliques	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %
Transfusion	77	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
	11 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %
Transmission mère-enfant	582	32	17	6	8	5	6	6	5	6	8	4	679
	83 %	89 %	94 %	86 %	73 %	83 %	86 %	86 %	83 %	86 %	89 %	80 %	84 %
Autre, inconnu	16	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	30
	2 %	8 %	6 %	14 %	27 %	17 %	14 %	14 %	17 %	14 %	11 %	20 %	3 %
Total	698	36	18	7	11	6	7	7	6	7	9	5	810
	100 %	100 %	100,0 %										

^a Données provisoires non redressées pour les délais de déclaration.

Annexe 10 - Fréquence des pathologies opportunistes parmi les cas

de sida adultes diagnostiqués en 2003-2005, selon qu'ils ont bénéficié d'un traitement antirétroviral pré-sida ou qu'ils ont eu un diagnostic simultané de séropositivité et de sida (France, données du 31 mars 2006)

