

Date de publication : 22.07.2026

ÉDITION NOUVELLE AQUITAINE

## Canicule et santé

Point au 21/07/2026

### Points clés

#### Situation météorologique en Nouvelle-Aquitaine

Après l'épisode caniculaire étendu, durable et d'une sévérité exceptionnelle, qui a touché la région Nouvelle-Aquitaine et l'hexagone du 17 au 28 juin 2026, un nouvel épisode de forte chaleur a impacté la population néo-aquitaine entre le 05 et le 17 juillet 2026. La situation météorologique a entraîné le passage en vigilance orange canicule le 06 juillet pour sept départements (Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Landes, Deux-Sèvres et Lot-et-Garonne) et en vigilance jaune pour les autres ; le 07 juillet, tous les départements de la région ont été classés en vigilance orange canicule. Le passage en vigilance rouge a été indiqué le 10 juillet pour les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres puis étendu le 12 juillet à la Haute-Vienne, la Charente, la Corrèze, la Creuse, le Lot-et-Garonne et la Dordogne. Au 16 juillet, dix départements étaient encore en vigilance orange (tous sauf les Landes et les Pyrénées-Atlantiques). Le 18 juillet, tous les départements étaient en vigilance verte canicule.

Ce nouvel épisode caniculaire, de moindre intensité que le précédent, a été néanmoins durable et sévère et particulièrement inquiétant notamment pour les personnes vulnérables, déjà exposées lors des épisodes caniculaires précédents.

#### Analyse des indicateurs syndromiques (du 05 au 17 juillet)

- Le recours aux soins d'urgence toutes causes (urgences hospitalières du réseau Oscour® et SOS Médecins), tous âges et chez les 75 ans ou plus, est resté dans des fluctuations habituelles pour la période (hausse attendue le weekend du 12 au 14 juillet).
- L'activité des associations SOS Médecins et des urgences hospitalières pour l'indicateur iCanicule (hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) était en hausse sur la période, atteignant un niveau supérieur à ce qui a été observé lors de la vague de chaleur de mai 2026 et en deça de ce qui a été observé pendant l'épisode de juin. Si les effectifs sont restés modérés, un impact plus important est observé chez les personnes âgées de 75 ans et plus.
- Dans tous les départements, un recours aux soins modéré a été observé pour les indicateurs liés à la chaleur sur la période ; néanmoins, un impact hétérogène était observé avec un recours aux urgences plus élevé en Corrèze, Dordogne et Vienne et un recours aux associations SOS Médecins plus élevé en Charente-Maritime et Haute-Vienne (*interprétation prudente du fait de codage hétérogène selon les territoires*).

**Tableau 1. Synthèse des tendances pour les principaux indicateurs régionaux surveillés sur la période (05 au 17/07)**

|                                                                      | Actes SOS Médecins | Passages aux urgences | Hospitalisations post-urgences |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Recours aux soins totaux                                             | ↗                  | →                     | →                              |
| Recours aux soins pour l'indicateur composite iCanicule <sup>1</sup> | ↗                  | ↗                     | ↗                              |

Source : Santé publique France, Sursaud®

<sup>1</sup> Indicateur composite iCanicule : hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies (Oscour®) ; coups de chaleur et déshydratations (SOS Médecins)

## Prévention

La canicule peut entraîner un impact sanitaire considérable, il est donc primordial de bien s'en protéger. Certaines mesures doivent être mises en place surtout chez les personnes les plus à risque. Ces impacts sanitaires rappellent aussi la nécessité d'agir sur les environnements avec une stratégie d'adaptation au changement climatique renforcée, au niveau national et territorial. Des dommages collatéraux sont également observés avec une hausse des noyades nécessitant une vigilance renforcée pendant les vagues de chaleur.

Plus d'info : [Vivre avec la chaleur](#)

## Situation météorologique

Début juillet, quelques jours après l'épisode caniculaire de juin d'une sévérité exceptionnelle, un nouvel épisode de forte chaleur a touché la région Nouvelle-Aquitaine. Dans ce contexte, Météo France a proposé, le 05 juillet, le classement de six départements en vigilance jaune (Charente, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne). Le 06 juillet 2026, la situation météorologique a entraîné le passage en vigilance orange canicule pour sept départements (Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Landes, Deux-Sèvres et Lot-et-Garonne) et en vigilance jaune pour les autres. Le 07 juillet 2026, tous les départements de la région étaient classés en vigilance orange canicule.

Le passage en vigilance rouge a été indiqué le 10 juillet pour les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres puis a été étendu à la Haute-Vienne, la Charente, la Corrèze, la Creuse, le Lot-et-Garonne et la Dordogne le 12 juillet.

Au 16 juillet, dix départements étaient encore en vigilance orange (tous sauf les Landes et les Pyrénées-Atlantiques). Le 18 juillet, tous les départements étaient en vigilance verte canicule. Ce nouvel épisode caniculaire, de moindre intensité que le précédent, a été néanmoins durable et sévère et particulièrement inquiétant notamment pour les personnes vulnérables, déjà exposées lors des épisodes caniculaires précédents. De nombreux facteurs aggravants sont à souligner tel que les départs en vacances (population qui voyage, notamment en voiture ou train), les rassemblements de population à l'occasion d'événements sportifs (coupe du monde de football, tour de France cycliste) et culturels (fêtes du 14 juillet, festivals de musique) et un risque accru de noyades en lien avec les fortes températures.

## Synthèse sanitaire

### Activité toutes causes

Sur la période de vigilance (du 05 au 17 juillet 2026), le recours aux soins d'urgence toutes causes (nombre de passages aux urgences et actes SOS Médecins) est resté dans des fluctuations habituelles pour la période (tous âges et 75 ans et plus). Une hausse attendue a néanmoins été observée le weekend du 12 au 14 juillet 2026.

### Indicateurs syndromiques

Sur la période de vigilance de l'épisode de forte chaleur (incluant les jours en vigilance jaune canicule), le nombre de passage aux urgences et dans les associations SOS Médecins pour iCanicule a augmenté modérément :

- 770 passages pour iCanicule ont été comptabilisés et 344 actes SOS Médecins, soit respectivement 1,2 % de l'activité totale des urgences et 1,3 % de l'activité totale SOS Médecins.
- Le nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour iCanicule a également augmenté avec 474 hospitalisations sur la période (62 % des passages iCanicule), dont 72 % concernaient des personnes âgées de 75 ans et plus.
- Sur la période, plus de la moitié des passages aux urgences pour iCanicule a concerné des personnes âgées de 75 ans et plus (55 %). Dans les associations SOS Médecins, les actes pour iCanicule concernaient en majorité des personnes âgées de 15-44 ans (37 %) et des personnes âgées de 75 ans et plus (26 %). Néanmoins, au regard du recours toutes causes, près de 4 % de l'activité aux urgences chez les personnes âgées était liée à la chaleur et cela atteint 5 % dans les associations SOS Médecins. Chez les personnes de 15-44 ans, l'activité pour canicule représentait respectivement 0,5 % et 1,1 % de l'activité toutes causes pendant cette période ; chez les plus jeunes de moins de 15 ans, cela représentait respectivement 0,5 % et 0,9 %.
- Aux urgences, les diagnostics de recours aux soins pour l'indicateur iCanicule les plus fréquents étaient des hyperthermies et coups de chaleur (31 %) et des déshydratations (41 %). Dans les associations SOS Médecins, 72 % des actes iCanicule étaient des coups de chaleur.

Pour tous les départements de la région, le taux de recours aux urgences hospitalières pour iCanicule est resté modéré, oscillant entre 0,5 % dans les Pyrénées-Atlantiques à 1,9 % en Dordogne (Tableau 4). Un recours important aux associations SOS Médecins La Rochelle et SOS Limoges a été enregistré (respectivement 2,6 % et 2,2 % de l'activité totale).


## Illustrations

**Tableau 2. Évolution du nombre (et du pourcentage) de passages aux urgences du réseau Oscore® pour iCanicule tous âges et chez les 75 ans et plus, du 05 au 17 juillet 2026, Nouvelle-Aquitaine, données au 21/07/2026**

|         | Nombre de passages iCanicule | Part d'activité iCanicule (%) | Nombre de passages iCanicule (75 ans et plus) | Part d'activité iCanicule (%) (75 ans et plus) |
|---------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 05-juil | 38                           | 0,9                           | 22                                            | 3,3                                            |
| 06-juil | 60                           | 1,3                           | 34                                            | 3,8                                            |
| 07-juil | 71                           | 1,7                           | 37                                            | 4,8                                            |
| 08-juil | 49                           | 1,1                           | 29                                            | 3,4                                            |
| 09-juil | 60                           | 1,4                           | 34                                            | 3,8                                            |
| 10-juil | 80                           | 1,8                           | 35                                            | 3,7                                            |
| 11-juil | 56                           | 1,3                           | 29                                            | 3,6                                            |
| 12-juil | 70                           | 1,7                           | 29                                            | 3,8                                            |
| 13-juil | 75                           | 1,5                           | 54                                            | 5,5                                            |
| 14-juil | 60                           | 1,5                           | 28                                            | 4,1                                            |
| 15-juil | 53                           | 1,1                           | 24                                            | 2,4                                            |
| 16-juil | 46                           | 1,0                           | 32                                            | 3,7                                            |
| 17-juil | 50                           | 1,1                           | 36                                            | 3,7                                            |


Source : Santé publique France, Sursaud®

**Figure 1. Évolution du nombre et de la proportion de passages aux urgences du réseau Oscore® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Nouvelle-Aquitaine, données au 21/07/2026**




Source : Santé publique France, Sursaud®

**Figure 2. Évolution du nombre de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule par classe d'âge, Nouvelle-Aquitaine, données au 21/07/2026**



Source : Santé publique France, Sursaud®

**Figure 3. Évolution spatiale des proportions départementales de passages codés aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale, Nouvelle-Aquitaine, du 05 au 16 juillet 2026**



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®





Tableau 3. Évolution du nombre (et du pourcentage) d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges et chez les 75 ans et plus, du 05 au 17 juillet 2026, Nouvelle-Aquitaine, données au 21/07/2026

|         | Nombre d'actes iCanicule | Part d'activité iCanicule (%) | Nombre d'actes iCanicule (75 ans et plus) | Part d'activité iCanicule (%) (75 ans et plus) |
|---------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 05-juil | 15                       | 0,7                           | 0                                         | 0,0                                            |
| 06-juil | 32                       | 1,7                           | 6                                         | 5,5                                            |
| 07-juil | 24                       | 1,5                           | 5                                         | 5,6                                            |
| 08-juil | 49                       | 2,8                           | 10                                        | 8,8                                            |
| 09-juil | 24                       | 1,3                           | 7                                         | 6,8                                            |
| 10-juil | 26                       | 1,4                           | 8                                         | 7,1                                            |
| 11-juil | 25                       | 1,1                           | 13                                        | 7,0                                            |
| 12-juil | 38                       | 1,6                           | 13                                        | 7,1                                            |
| 13-juil | 33                       | 1,4                           | 7                                         | 3,8                                            |
| 14-juil | 27                       | 1,2                           | 8                                         | 4,7                                            |
| 15-juil | 18                       | 0,9                           | 6                                         | 4,8                                            |
| 16-juil | 23                       | 1,2                           | 4                                         | 3,4                                            |
| 17-juil | 9                        | 0,5                           | 4                                         | 3,1                                            |


Source : Santé publique France, Sursaud®

Figure 4. Évolution du nombre et de la proportion d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Nouvelle-Aquitaine, données au 21/07/2026




Source : Santé publique France, Sursaud®

**Figure 5. Évolution du nombre d'actes SOS Médecins pour iCanicule par classe d'âge, Nouvelle-Aquitaine, données au 21/07/2026**




Source : Santé publique France, Sursaud®

**Figure 6. Évolution spatiale des proportions départementales d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Nouvelle-Aquitaine, du 05 au 16 juillet**



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®

Part d'actes codés pour iCanicule (en %) :



Vigilance canicule



**Tableau 4. Bilan des données de recours aux soins pour iCanicule, par département, Nouvelle-Aquitaine (période du 05 au 17 juillet 2026)**

| Départements | Nombre et part d'activité iCanicule<br>(urgences hospitalières) | Nombre et part d'activité iCanicule (SOS Médecins) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 16           | 29 (1,1 %)                                                      |                                                    |
| 17           | 86 (1,1 %)                                                      | 34 (2,6 %)                                         |
| 19           | 37 (1,6 %)                                                      |                                                    |
| 23           | 10 (0,9 %)                                                      |                                                    |
| 24           | 76 (1,9 %)                                                      |                                                    |
| 33           | 205 (1,3 %)                                                     | 181 (1,6%)                                         |
| 40           | 45 (1,1 %)                                                      | 9 (0,5 %)                                          |
| 47           | 51 (1,3 %)                                                      |                                                    |
| 64           | 44 (0,5 %)                                                      | 62 (0,7 %)                                         |
| 79           | 43 (1,2 %)                                                      |                                                    |
| 86           | 77 (1,8 %)                                                      |                                                    |
| 87           | 67 (1,4 %)                                                      | 58 (2,2 %)                                         |
| Total        | 770 (1,2 %)                                                     | 344 (1,3 %)                                        |



- Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
- L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.
- Concernant la mortalité, un bulletin spécifique sera publié mais la consolidation des données ne permet pas une estimation fiable et est probablement sous-estimée.

## Méthodologie

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un [document complémentaire disponible en ligne](#).

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

## Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires nationaux et en région Nouvelle-Aquitaine qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau Oscour® et les associations SOS Médecins.

## En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur. Aussi, Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention précisés sur notre page « notre action ».

## Les gestes et astuces pour mieux vivre avec la chaleur

- [Vivre avec la chaleur](#)

## Dossiers et rapports de Santé publique France

- [Dossier fortes chaleurs et canicules](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)

## Dossiers Météo France

- [Le réchauffement climatique observé à l'échelle du globe et en France](#)

**Equipe de rédaction :** Equipe de Santé publique France Nouvelle-Aquitaine

**Pour nous citer :** Bulletin. Canicule et santé. Point au 21/07/2026. Édition régionale Nouvelle-Aquitaine. Saint-Maurice : Santé publique France, 8 p., 2026.

**Dépôt légal :** Nouvelle Aquitaine

**Date de publication :** 22 juillet 2026

**Contact :** [presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)