

Date de publication : 22.10.2026

GUYANE

Surveillance épidémiologique des arboviroses

Semaine 42 (du 12 au 18 octobre 2026)

Points et indicateurs clés

Dengue

L'activité liée à la dengue est faible sur l'ensemble du territoire.

Chikungunya

Depuis fin janvier (S04), 2 130 cas de chikungunya ont été biologiquement confirmés en Guyane, dont 19 en S42 (données non consolidées). La circulation du virus reste active sur le territoire :

- **Littoral Ouest** : l'épidémie de chikungunya est terminée sur ce secteur qui est en post-épidémie depuis S38. En S42, la circulation du virus était très faible sur cette partie du territoire, cependant une vigilance doit être maintenue dans la mesure où une reprise épidémique ne peut être exclue compte tenu de la situation régionale.
- **Savanes** : le nombre de passages aux urgences du CHK pour suspicion de chikungunya était stable, avec une part d'activité liée à ces passages supérieure à 5 %. L'épidémie se poursuit dans ce secteur.
- **Ile de Cayenne** : en S42, 2 foyers actifs étaient en cours de suivi dans le secteur. Le nombre de cas confirmés demeurerait faible, de même que l'activité aux urgences du CHC. L'Ile de Cayenne reste en phase de foyers épidémiques.
- **Maroni** : aucun nouveau cas n'a été biologiquement confirmé en S42 dans ce secteur, qui est en phase de transmission sporadique.
- **Intérieur, Intérieur Est et Oyapock** : aucun nouveau cas n'a été biologiquement confirmé en S42. Ces secteurs sont en phase de veille épidémiologique.

■ Situation épidémiologique détaillée : pages 2 à 8

Chikungunya

Depuis la détection du 1^{er} cas confirmé de chikungunya fin janvier (S2026-04), 2 130 cas ont été biologiquement confirmés en Guyane. Le Littoral Ouest est en post-épidémie (depuis S38), le secteur des Savanes reste en épidémie (depuis S23), l'Ile de Cayenne est en phase de foyers épidémiques (depuis S18), le Maroni est en phase de transmission sporadique (depuis S11) et les secteurs de l'Intérieur, de l'Intérieur Est et de l'Oyapock sont en veille épidémiologique. Les niveaux de gestion du plan ORSEC de lutte contre les arboviroses définis par les autorités sanitaires sont présentés en page 7.

Surveillance virologique

En S41 et S42, respectivement 37 et 19 cas de chikungunya ont été biologiquement confirmés (données non consolidées en S42).

La tendance à l'échelle régionale est difficilement interprétable car les dynamiques épidémiologiques par secteur sont hétérogènes.

Au total, depuis le début de l'année, 2 096 cas ont été biologiquement confirmés. Le sex-ratio H/F est de 0,8 (45 % d'hommes) et l'âge médian de 36 ans [IQR : 16 – 54]. Parmi ces cas, 25 % ont moins de 15 ans et 17 % ont 60 ans et plus.

Cas hospitalisés

Depuis janvier 2026, 387 cas probables ou confirmés de chikungunya ont été hospitalisés (données en cours de consolidation) dont 245 au CHOG, 111 au CHK et 31 au CHC.


L'âge médian des cas hospitalisés était de 28 ans [IQR : 8 – 56] et 11 % étaient âgés de moins de 3 ans. Le sex-ratio H/F était de 0,8 et la durée médiane de séjour de 2,1 jours [IQR : 1,1 - 4,1].

Selon un premier classement provisoire, 79 % des cas hospitalisés ont présenté une forme commune du chikungunya, 13 % une forme inhabituelle et 8 % une forme sévère. Cependant, ces proportions sont à interpréter avec prudence dans la mesure où le classement définitif, par un infectiologue référent, tend à notablement réduire le nombre de cas sévères.


Par ailleurs, 212 cas (55 %) présentaient des facteurs de risque et/ou des comorbidités, dont les principaux étaient l'hypertension artérielle, la grossesse et le diabète. Trois cas de transmission materno-néonatale ont été enregistrés : un a été classé comme forme non-sévère et deux ont présenté une forme sévère de la maladie.

Depuis le début de la surveillance, 4 décès chez des patients biologiquement confirmés de chikungunya ont été enregistrés : pour 2 d'entre eux, la cause du décès n'était pas l'infection par le


Nombre hebdomadaire de cas biologiquement confirmés de chikungunya, tous âges, Guyane, depuis janvier 2026



Nombre hebdomadaire de cas biologiquement confirmés de chikungunya par secteur, tous âges, Guyane, depuis janvier 2026



Nombre hebdomadaire de cas hospitalisés pour chikungunya, tous âges, Guyane, depuis janvier 2026



chikungunya, pour 1, la cause du décès était indirectement liée au chikungunya et pour le dernier, le décès était directement en lien avec le chikungunya.

Le tableau ci-après résume les caractéristiques des cas hospitalisés. Pour deux cas - dont un des décès - le caractère commun, inhabituel ou sévère de leur chikungunya n'a pas pu être déterminé, ils ne sont donc pas inclus dans le tableau ci-après.

Caractéristiques des cas hospitalisés pour chikungunya, tous âges, Guyane, depuis janvier 2026 (N = 385) – Classement des formes communes, inhabituelles et sévères provisoires

	Formes communes		Formes inhabituelles		Formes sévères		Total	
	(N = 304 ; 79 %)		(N = 49 ; 13 %)		(N = 32 ; 8 %)		(N = 385)	
Sexe								
Femmes	176	58 %	25	51 %	18	56 %	219	57 %
Hommes	128	42 %	24	49 %	14	44 %	166	43 %
Classes d'âge								
< 1	14	5 %	1	2 %	9	28 %	24	6 %
1 à 2	13	4 %	3	6 %	3	9 %	19	5 %
3 à 14	76	25 %	15	31 %	2	6 %	93	24 %
15 à 29	57	19 %	4	8 %	7	22 %	68	18 %
30 à 44	37	12 %	6	12 %	3	9 %	46	12 %
45 à 59	45	15 %	8	16 %	2	6 %	55	14 %
60 et +	62	20 %	12	24 %	6	19 %	80	21 %
Au moins un facteur de risque / comorbidité (incluant grossesse)								
Non	141	46 %	17	35 %	15	47 %	173	45 %
Oui	163	54 %	32	65 %	17	53 %	212	55 %
1-2	138	85 %	23	72 %	13	76 %	174	82 %
3-4	24	15 %	7	22 %	3	18 %	34	16 %
5-6	1	1 %	2	6 %	1	6 %	4	2 %
Facteurs de risque / comorbidités								
Hypertension artérielle	64	21 %	15	31 %	7	22 %	86	22 %
Grossesse	36	20 %	4	16 %	7	39 %	47	21 %
Diabète	30	10 %	5	10 %	6	19 %	41	11 %
Atteinte respiratoire	13	4 %	4	8 %	0	0 %	17	4 %
Drépanocytose	10	3 %	5	10 %	0	0 %	15	4 %
Maladie cardio-vasculaire	11	4 %	3	6 %	3	9 %	17	4 %
Insuffisance rénale	9	3 %	5	10 %	2	6 %	16	4 %
Obésité	14	5 %	2	4 %	1	3 %	17	4 %
Accident vasculaire cérébral	9	3 %	1	2 %	1	3 %	11	3 %
Immunodépression	10	3 %	2	4 %	0	0 %	12	3 %
Prématurité	6	2 %	1	2 %	1	3 %	8	2 %
Autre	53	17 %	12	24 %	4	13 %	69	18 %
Symptômes								
Fièvre	295	97 %	43	88 %	29	91 %	367	95 %
Arthralgies/artrites	234	77 %	31	63 %	19	59 %	284	74 %
Myalgies	119	39 %	16	33 %	11	34 %	146	38 %
Céphalées	106	35 %	17	35 %	9	28 %	132	34 %
Nausées/vomissements	79	26 %	11	22 %	7	22 %	97	25 %
Atteinte cardio-vasculaire aigüe	29	10 %	14	29 %	17	53 %	60	16 %
Diarrhées	36	12 %	4	8 %	3	9 %	43	11 %
Rash	27	9 %	5	10 %	4	13 %	36	9 %
Douleurs abdominales	28	9 %	6	12 %	2	6 %	36	9 %
Œdèmes périarticulaires	24	8 %	4	8 %	2	6 %	30	8 %
Atteinte hépatique sévère	12	4 %	6	12 %	10	31 %	28	7 %
Atteinte neurologique	6	2 %	13	27 %	5	16 %	24	6 %



	Formes communes		Formes inhabituelles		Formes sévères		Total	
	(N = 304 ; 79 %)		(N = 49 ; 13 %)		(N = 32 ; 8 %)		(N = 385)	
Décompensation pathologies préexistantes	4	1 %	11	22 %	3	9 %	18	5 %
Syndrome hyperalgique	7	2 %	10	20 %	2	6 %	19	5 %
Atteinte respiratoire	4	1 %	2	4 %	7	22 %	13	3 %
Atteinte dermatologique inhabituelle	7	2 %	2	4 %	1	3 %	10	3 %
Atteinte rénale	2	1 %	4	8 %	3	9 %	9	2 %
Manifestations hémorragiques ou thrombotiques	3	1 %	2	4 %	1	3 %	6	2 %
Prurit	5	2 %	1	2 %	0	0 %	6	2 %
Manifestations digestives sévères	1	0 %	1	2 %	0	0 %	2	1 %
Ténosynovites	0	0 %	1	2 %	0	0 %	1	0 %
Hospitalisation en Réa/USI								
Hospitalisation en Réa/USI	1	0 %	4	8 %	10	31 %	15	4 %
Défaillances								
Défaillance d'organe	20	7 %	5	10 %	29	91 %	54	14 %
Défaillance cardiocirculatoire	11	4 %	3	6 %	23	72 %	37	10 %
Défaillance hépatique	9	3 %	1	2 %	9	28 %	19	5 %
Défaillance cérébrale	0	0 %	2	4 %	4	13 %	6	2 %
Défaillance respiratoire	2	1 %	1	2 %	6	19 %	9	2 %
Défaillance rénale	1	0 %	1	2 %	4	13 %	6	2 %
Défaillance autre	2	1 %	0	0 %	1	3 %	3	1 %
Issue de l'hospitalisation								
Retour à domicile	303	100 %	47	100 %	30	94 %	380	99 %
Décès	1	0 %	0	0 %	2	6 %	3	1 %
Directement lié au chikungunya	0	0 %	0	0 %	1	50 %	1	33 %
Indirectement lié au chikungunya	0	0 %	0	0 %	1	50 %	1	33 %
Sans rapport avec le chikungunya	1	100 %	0	0 %	0	0 %	1	33 %

Situation épidémiologique par secteur

La surveillance du chikungunya est organisée par secteur pour tenir compte des dynamiques infrarégionales des épidémies et orienter les mesures de gestion.

La Guyane est ainsi divisée en 22 communes réparties sur 7 secteurs.

En raison du manque d'exhaustivité des adresses de résidence des cas confirmés, la méthodologie de répartition des cas par secteur a été ajustée à partir de S24. Parmi les cas confirmés, ceux sans adresse de résidence disponible ont été attribués au secteur du laboratoire préleveur lorsqu'il était connu. Les cas pour lesquels ni l'adresse de résidence ni le laboratoire n'étaient identifiables n'ont pas été inclus dans l'analyse par secteur présentée ci-dessous.

Répartition des 22 communes de Guyane dans les 7 secteurs de surveillance





Secteur du Littoral Ouest

Le nombre de cas biologiquement confirmés était faible et stable avec moins de 5 cas confirmés hebdomadaires depuis S39.

En S41 et S42, moins de 5 passages hebdomadaires aux urgences du CHOG pour suspicion de chikungunya (code A92.0) ont été enregistrés. La part d'activité du chikungunya était faible et inférieure à 1 % en S41.

L'activité liée au chikungunya était faible sur le Littoral Ouest. **La circulation virale poursuit son ralentissement dans ce secteur, qui est en post-épidémie depuis S38.**

Nombre hebdomadaire de cas biologiquement confirmés de chikungunya, tous âges, secteur du Littoral Ouest, Guyane, depuis janvier 2026



* Données indisponibles en S2026-26


Secteur de l'Île de Cayenne

En S41 et S42, le nombre de cas biologiquement confirmés était toujours en baisse et moins de 5 cas étaient enregistrés chaque semaine.

En S42, 2 foyers étaient actifs sur l'Île de Cayenne, comptant, en moyenne, 5 cas confirmés.


Le nombre de passages aux urgences pour suspicion de chikungunya (code A92.0) était faible au CHC, aucun passage pour ce motif n'a été observé au cours des deux dernières semaines.

Nombre hebdomadaire de cas biologiquement confirmés de chikungunya, tous âges, secteur de l'Île de Cayenne, Guyane, depuis janvier 2026



* Données de S2026-42 en cours de consolidation

Nombre hebdomadaire de passages et part d'activité du chikungunya aux urgences du CHC, tous âges, secteur de l'Île de Cayenne, Guyane, depuis janvier 2026



Malgré un net ralentissement de la circulation virale observé ces dernières semaines, l'Île de Cayenne reste en phase de foyers épidémiques.

Secteur des Savanes

Le secteur des Savanes étant en épidémie, l'analyse de la situation épidémiologique repose principalement sur la surveillance syndromique (passages aux urgences).

Le nombre de passages aux urgences pour suspicion de chikungunya au CHK (code A92.0) était à un niveau modéré, avec respectivement 16 et 19 passages enregistrés pour ce motif en S41 et S42. La part d'activité liée à ces passages s'élevait à 6 % en S42. La tendance des indicateurs est stable depuis 5 semaines.

Une stabilisation des passages aux urgences à un niveau modéré est observée dans le secteur des Savanes depuis un mois. L'épidémie de chikungunya se poursuit toutefois dans ce secteur.

Secteur du Maroni

En S41 et S42, aucun cas de chikungunya n'a été biologiquement confirmé sur le Maroni.


Depuis le début de l'année, 41 cas ont été confirmés dans ce secteur, répartis sur quatre communes. La circulation du virus est sporadique.

Par ailleurs, aucune consultation pour suspicion de chikungunya n'a été enregistrée en S41 et S42 dans les CDPS du Maroni.

Depuis le début de l'année, 32 consultations pour suspicion de chikungunya (code A92.0) ont été notifiées par les CDPS de ce secteur.


La situation épidémiologique est stable sur le Maroni qui reste en phase de transmission sporadique.

Nombre hebdomadaire de cas biologiquement confirmés de chikungunya, tous âges, secteur des Savanes, Guyane, depuis janvier 2026




* Données de S2026-42 en cours de consolidation

Nombre hebdomadaire de passages et part d'activité du chikungunya aux urgences du CHK, tous âges, secteur des Savanes, Guyane, depuis janvier 2026




Nombre hebdomadaire de cas biologiquement confirmés de chikungunya, tous âges, secteur du Maroni, Guyane, depuis janvier 2026



* Données de S2026-42 en cours de consolidation

Nombre hebdomadaire de consultations pour suspicion de chikungunya dans les CDPS et hôpitaux de proximité, secteur du Maroni, tous âges, Guyane, depuis janvier 2026



Secteurs de l'Intérieur, de l'Intérieur Est et de l'Oyapock

Depuis S2026-04, un cas probable (IgM positifs) a été notifié dans le secteur de l'Oyapock et un cas confirmé (RT-PCR positive) dans celui de l'Intérieur. Ces deux cas, ayant consulté en CDPS, s'étaient rendus en zone de circulation active du virus dans les jours précédents leur date de début des signes.

Aucune consultation pour suspicion de chikungunya n'a été enregistrée par les CDPS et aucun cas n'a été biologiquement confirmé dans le secteur de l'Intérieur Est.

La situation épidémiologique correspond à une phase de veille épidémiologique.

Plan ORSEC de lutte contre les arboviroses

Le plan ORSEC de lutte contre les arboviroses est un dispositif de gestion de crise qui vise à organiser et préparer de manière opérationnelle l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre les arboviroses connues et émergentes (dengue, chikungunya, Zika), sous le pilotage de l'ARS et de la préfecture.

Il précise les missions de chaque partenaire et prévoit une graduation de la réponse tout au long de la circulation virale. Cinq niveaux sont déterminés par l'ARS pour chaque territoire en fonction de la situation épidémiologique, mais également de la capacité de l'offre de soins (activité des urgences, capacités d'hospitalisations et de diagnostic biologique) et de réponses en matière de lutte-antivectorielle. Ces niveaux de risque sont réévalués régulièrement à partir des indicateurs transmis par les différents partenaires.

Santé publique France a pour mission d'apporter les éléments en lien avec la situation épidémiologique et la sévérité de l'épidémie.


Niveaux du plan ORSEC de lutte contre les arboviroses

Niveau ORSEC	Situation sanitaire	Dispositif associé
	Situation normale de veille	Gestion habituelle des signaux
Niveau 1	Situation de veille et réponses renforcées	Transmission locale avérée sans impact sur les capacités de réponses
Niveau 2	Situation d'alerte	Capacités de réponses renforcées
Niveau 3	Situation sanitaire exceptionnelle	Tensions sur les capacités de réponses
Niveau 4	Situation de crise	Saturation des capacités de réponses

Actuellement, la situation de chaque secteur, définie par le plan ORSEC de lutte contre les arboviroses, est la suivante :

- **Littoral Ouest** : Niveau 1 - Situation de veille et de réponses renforcées
- **Savanes** : Niveau 2 - Situation d'alerte
- **Ile de Cayenne** : Niveau 1 - Situation de veille et de réponses renforcées
- **Maroni** : Niveau normal de veille
- **Intérieur Est, Intérieur et Oyapock** : Niveau normal de veille

Prévention



Partenaires

Santé publique France remercie le réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance des infections respiratoires aiguës, des arboviroses, du paludisme et des gastro-entérites aiguës : les urgences, les centres de santé et hôpitaux de proximité, les laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, l'Institut Pasteur de la Guyane, les infirmières de veille hospitalière du CHU, la médecine libérale et hospitalière, l'Agence régionale de santé de Guyane, la Collectivité Territoriale de Guyane, la Direction interarmées du service de santé en Guyane, les équipes EMIP et EMSPEC, les sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, la Cnam, l'Inserm et l'Insee.



Equipe de rédaction

Luisiane Carvalho, Sophie Devos, Marion Petit-Sinturel, Tiphane Succo

Pour nous citer : Bulletin de surveillance épidémiologique des arboviroses. Région Guyane. Semaine 42 (du 12 au 18 octobre 2026). Saint-Maurice : Santé publique France, 8 pages, 2026.

Directeur de publication : Étienne Pot, directeur général

Date de publication : 22 octobre 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr