



Bulletin

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE


Semaine 40 (du 28 septembre au 04 octobre 2026) – Date de publication : 8 octobre 2026

ÉDITION GRAND EST

Niveaux d'alerte

Syndromes grippaux

Bronchiolite (moins de 1 an)



Points clés



Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an - p.5

Les indicateurs pour la bronchiolite étaient en augmentation jusqu'en semaine 39-2026, mais restent à des niveaux d'activité faibles et habituels pour la période. Le VRS est détecté sporadiquement mais d'autres virus susceptibles d'induire des bronchiolites circulent activement, en particulier des rhinovirus.



Syndromes grippaux - p.6

L'activité liée à la grippe est à son niveau de base dans la région.



COVID-19 - p.7

Comme lors des deux années précédentes à la même période, les indicateurs syndromiques pour COVID-19 sont en augmentation ces dernières semaines. L'activité en ville et dans les services d'urgence, même si elle est en hausse, reste inférieure à celle des deux saisons passées.



Gastro-entérites aiguës - p.9

Les passages aux urgences et les consultations SOS Médecins fluctuent à des niveaux habituels pour la saison.

Actualités

Prévention de la bronchiolite

Les virus respiratoires syncytiaux (VRS) occasionnent des épidémies d'infections respiratoires hivernales dont le retentissement peut être grave aux deux pôles de la vie : chez les très jeunes enfants et chez les personnes âgées.

Infection à VRS du nourrisson

La prévention repose sur deux stratégies alternatives en complément des gestes barrières :

- La vaccination des femmes enceintes ;
- L'immunisation des nourrissons par anticorps monoclonaux.

La campagne de prévention se déroule chaque année en amont du début de la période épidémique et jusqu'à la fin de cette période. Les dates des campagnes sont fixées en fonction des données épidémiologiques de la saison en cours et de la dynamique des épidémies des dernières saisons. Elles peuvent donc différer selon les territoires (France métropolitaine et DROM).

Pour la saison 2026-2027 en France hexagonale : la campagne se déroule du 14 septembre 2026 au 28 février 2027.

MINISTÈRE
DU TRAVAIL
DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS
*Liberté
Égalité
Fraternité*



Santé
publique
France

Infection à VRS des personnes âgées

La vaccination contre le VRS est recommandée pour toutes les personnes âgées de 75 ans et plus, ainsi que pour les personnes de 65 ans et plus à risque. Dans ce contexte, la vaccination ne nécessite qu'une seule dose*.

*A ce jour, le vaccin n'est pas de prise en charge par l'Assurance Maladie pour ces populations.

Recommandations vaccinales

Bronchiolite



Pour la protection des nouveau-nés, la prévention de l'infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) s'appuie sur deux stratégies alternatives :

- la vaccination des femmes enceintes entre la 32ème et la 36ème semaines d'aménorrhées (si cette période est située entre septembre et janvier) ;
- l'administration d'anticorps monoclonaux anti-VRS aux nouveaux nés eux-mêmes.

La vaccination contre le VRS est également recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires et toutes les personnes de 75 ans et plus.

Syndromes grippaux



Chaque année, la vaccination est recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes présentant des maladies chroniques, aux femmes enceintes, aux personnes en situation d'obésité, et à certains professionnels, dont les professionnels de santé. La vaccination est également ouverte aux enfants de 2 à 17 ans et plus. **La campagne de vaccination débutera le 13 octobre 2026 en France hexagonale.**

COVID-19



La vaccination est recommandée chaque année, à l'automne, pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à risque de forme grave de Covid-19. **La campagne de vaccination débutera le 13 octobre 2026 en France hexagonale.**

Gastro-entérites aiguës



La vaccination des nourrissons contre le rotavirus est recommandée pour tous les nourrissons dès l'âge de 6 semaines.

Deux vaccins sont disponibles en France, il s'agit de vaccins « à boire » (oraux) : aucune injection n'est nécessaire.

Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an



Figure 1. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2024. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 2. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2024. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



Syndromes grippaux



Figure 3. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2024. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 4. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2024. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



COVID-19



Figure 5. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2024. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)




Figure 6. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2024. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)





Figure 7. Evolution de la circulation du SARS-Cov-2 dans les eaux usées en Grand Est depuis la semaine 2026-03. (Source SUM'EAU).



* Le dispositif de surveillance microbiologique des eaux usées (SUM'EAU) permet de suivre la circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau de la région Grand Est à partir d'un suivi réalisé auprès de 5 stations de traitement des eaux usées selon une fréquence hebdomadaire. Les 5 stations suivies sont localisées à proximité des agglomérations de Reims, Nancy, Metz, Strasbourg et Mulhouse. L'indicateur eaux usées correspond au ratio de concentration virale de SARS-CoV-2 sur la concentration en azote ammoniacal.

Gastro-entérites aiguës



Figure 8. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 9. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des consultations depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



Mortalité toutes causes

Figure 10. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 39-2026, Grand Est (Source : Insee, au 07/10/2026)



Remerciements à nos partenaires

- Services d'urgences du réseau OSCOUR® ;
- Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes ;
- Réseau Sentinelles ;
- Systèmes de surveillance spécifiques :
 - Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation ;
 - Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées ;
 - Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg ;
- Autres partenaires régionaux spécifiques :
 - Observatoire des urgences Est-RESCUE ;
 - Agence régionale de santé Grand Est.

Comité de rédaction

Virginie Bier, Morgane Colle, Caroline Fiet, Nadège Marguerite, Lidiana Munerol, Sophie Raguét, Marion Rollin, Justine Trompette.

Pour nous citer : Bulletin épidémiologique. Édition Grand Est. 08 octobre. Saint-Maurice : Santé publique France, 9 pages, 2026. Directeur de publication : Etienne POT

Dépôt légal : 08 octobre 2026

Contact : grandest@santepubliquefrance.fr

Contact presse : presse@santepubliquefrance.fr